


憶思能 Exelon

【主要治療項目】

治療輕度到中度因阿茲海默症所引起的痴呆症狀及其他相關症狀

1.5 mg	3mg
	
4.5 mg	4.6 mg/貼片
	

【服藥須知】

- 建議開始劑量為 1.5mg，一天兩次，如果這個劑量在至少兩個星期的治療後有很好的耐受性，則劑量可以增加至 3mg，一天兩次。其次，如果在上述劑量治療，最少兩個星期後，耐受性良好，可以考慮增加劑量至 4.5mg 接著 6mg，一天兩次。請依照醫師處方規則用藥，勿自行更改藥量、服藥時間及擅自停藥，如有問題請洽詢藥師或醫師。
- 若忘記服藥，可在想起時立刻補吃，但若已經接近下次的給藥時間則跳過此次不需要補吃，而照下次服藥時間服下一次劑量。千萬不可以一次吃兩次的藥量。

3. **定期門診追蹤。**可能導致腸胃不適、出汗、身體不適、體重減輕、顫抖；偶有睏倦、步伐不穩、平衡失調、紅疹、心跳太快、呼吸困難。若有任何異常反應發生時，應該儘快與醫師討論。
4. **藥物的存放：**室溫儲存，藥品應置於攝氏 15 ~ 25 度乾燥陰涼的處所；如發生變質或過期，不可再食用。應放置於兒童取不到的地方，以免誤食。
5. **服藥初期或調整藥量階段**可能會讓您覺得頭暈或睏倦，在未確定此藥對您有何影響之前，從事具潛在危險之活動，應有人陪同**避免開車、操作危險性機械**，注意行動安全，防止意外發生。
6. 在起床、起立或姿勢改變時**速度要緩慢**，以避免頭暈、跌倒。
7. **懷孕：**在動物研究上，本品不會造成畸形因子，然而本品在懷孕婦女身上的安全性並未建立，因此對於懷孕婦女只有在治療利益大於對胎兒的危險性下才能給藥。
8. **哺乳：**本品會不會被分泌至人類的乳汁中，並不清楚，病患服用本品時不可以餵乳。
9. **使用貼片步驟：**
 - (1) 沿虛線或切痕剪開，取出完整的貼片。
 - (2) 撕下保護襯墊的一側，手指不要碰到貼片的黏貼部份。
 - (3) 貼片可黏貼在上背、下背、上臂或胸部，然後撕掉另一側保護襯墊。
 - (4) 以手按壓貼片以確保貼片邊緣都黏妥，可用原子筆在 Exelon® 貼片上記錄貼上之日期。
10. **使用貼片需注意事項：**
 - (1) 每天只能使用一片。
 - (2) 建議將貼片貼在上、下背、上臂或胸部。
 - (3) 需每天更換新的貼片，並變換不同部位黏貼（例 如第一天貼

右側，第二天貼左側）。

- (4)相同的點 14 天內不宜重複黏貼，以避免皮膚刺激。
- (5)為避免影響貼片黏性，請勿將貼片貼於有乳膏、乳液或塗有粉末的皮膚。
- (6)每 24 小時必須將舊有貼片移除，才能將另一塊貼片貼於新處，且黏貼的時間應一致。可用原子筆在 Exelon®貼片上記錄貼上之日期。
- (7)不應將貼片剪成小塊或剪成一半或折疊。