失智症藥物治療

安立復 Abilify

高雄醫學大學附設中和紀念醫院

失智症友善專區衛教資訊高齡醫學團隊

主要治療項目

調整精神狀態（異常）、精神安定（緩和情緒）及其他相關症狀
(減輕伴隨精神症狀所產生的憂鬱、愧疚感、焦慮症狀)。

10 mg	藥品外觀描述
	粉紅色 四邊形錠劑（略長橢圓形） A-008, 10 / 無剝痕 （長8.0 mm, 寬 4.0 mm）

1. 依照醫師處方規則服藥，可能須數星期才見療效。當症狀消除或緩解時，仍需服用藥物以防疾病復發，不可自行減藥或停藥。
2. 若忘記服藥，可在想起時立刻補吃，但若已經接近下次的給藥時間則不需要補吃。千萬不可以一次吃

兩次的藥量。

3. 定期門診追蹤並密切留意血糖變化，初期服用藥物時可能會有感冒症狀、頭痛、失眠、胃腸不適、噁心或嘔吐等症狀，若出現任何未預期之疼痛或持續性不適發生時，應該儘快與醫師討論。
4. 服藥期間避免處於過熱的場所，並且每天多喝水。
5. 服用本藥期間切勿飲酒，以免造成嚴重不良反應發生。
6. 避免開車、操作危險性機械，注意行動安全，防止意外發生。
7. 在起床、起立或姿勢改變時速度要緩慢，以避免頭暈、跌倒。

藥物的存放：室溫儲存。應放置於兒童取不到的地方，以免誤食。

藥劑部　蕭惠娟