

金菩薩 Zyprexa

5 mg	【主要治療項目】
	調整精神狀態、精神安定、精神異常引起之相關症狀及其他 (減輕伴隨精神症狀所產生的憂鬱、愧疚感、焦慮症狀)。
黃色、圓形、1ZYZ5/無剝痕	

【服藥須知】

1. 依照醫師處方規則服藥，可能須數星期才見療效。當症狀消除或緩解時，仍需服用藥物以防疾病復發，不可自行減藥或停藥。
2. 若忘記服藥，可在想起時立刻補吃，但若已經接近下次的給藥時間則不需要補吃。千萬不可以一次吃兩次的藥量。
3. 定期門診追蹤，若肌肉痙攣、身體及顏面肌肉抖動或抽痛、舌頭或下顎運動異常及任何異常反應發生時，應該儘快與醫師討論。
4. 假如正在服用會引起嗜睡的藥物，如安眠藥、肌肉鬆弛劑、抗憂鬱劑、精神安定劑、鎮靜劑、感冒過敏藥或麻醉性止痛劑，請告知醫師。
5. 不可和酒或酒精性飲料同時使用，以免影響藥物作用。
6. 抽菸會使藥物的效果降低，有抽菸的人，請告知醫師調整用量。
7. 避免開車、操作危險性機械，注意行動安全，防止意外發生。

8. 在起床、起立或姿勢改變時**速度要緩慢**，以避免頭暈、跌倒。
9. 服用此藥可能會減少出汗，皮膚調節溫度的能力變差。假如體溫過高，可能會中暑。若在高溫氣候、運動或使用三溫暖設備時，請小心不要讓體溫過高。所以避免會引起過熱及脫水的活動（例如：**蒸汽浴**），保持身體的涼爽。
10. 藥物的存放：**室溫儲存**。藥品應置於乾燥陰涼的處所；如發生變質或過期，不可再食用。應放置於兒童取不到的地方，以免誤食。