

理思必妥 Risperdal

【主要治療項目】

調整精神狀態、精神安定、精神異常引起之相關症狀及其他
(減輕伴隨精神症狀所產生的憂鬱、愧疚感、焦慮症狀)。

2 mg	液劑 1mg/ml
	

【服藥須知】

1. 請依照醫師處方規則按時服藥，不可自行增加或減少劑量；亦不可自行停藥。期間，即便您自覺症狀改善，也切勿再未與醫師諮詢過的情況下自行停藥，特別是您服用較高的劑量一段時間後。當症狀消除或緩解時，仍需服用藥物以防疾病復發，若醫師衡量您的情況，需要為您停藥時，會採取逐漸停藥的方式。此藥物可能需規律的服用數星期後，才能發揮其最大藥效。
2. 如有服用其他處方藥或者非處方藥、維他命、營養補充品和中草藥時，請告知醫師或藥師。
3. 如果您有或曾有心臟、腎臟或肝臟方面疾病、心絞痛、心律不整、中風、痙攣、血液方面問題或曾有藥物或酒精濫用的過去史，請主動告知您的醫師。
4. 若忘記服藥，可在想起時立刻補吃，但若已經接近下次的給藥時

間則不需要補吃。千萬不可以一次吃兩次的藥量。

5. 定期門診追蹤，若有昏昏欲睡、眩暈、胃部不適、嘔吐、便秘、坐立不安、頭痛、體重增加、失眠、流鼻水、震顫、說話困難或緩慢、痙攣、視野模糊、發燒、皮疹或若舌頭做像捕蠅狀運動或下顎運動異常及任何異常反應發生時，應該儘快與醫師討論。
6. 不可和酒或酒精性飲料同時使用，以免影響藥物作用。
7. 服用此藥可能讓您昏昏欲睡，應盡量避免開車、操作危險性機械，注意行動安全，防止意外發生。
8. 在起床、起立或姿勢改變時速度要緩慢，以避免頭暈、跌倒。
9. 避免長時間曬陽光，以免皮膚過敏，外出可戴帽子、穿長袖衣服，或使用防曬品。
10. 藥物的存放：室溫儲存、並遠離熱源和潮濕。應放置於兒童取不到的地方，以免誤食。