

★ 檢查目的：

經過臨床醫師的評估，懷疑或確認您可能有淋巴系統阻塞或乳癌，黑色素瘤等前哨淋巴定位，因此為您安排了核醫淋巴顯像掃描。

★ 受檢者注意事項：

1. 請於約定日期及時間至檢查地點辦理報到候檢，報到時間請參閱預約通知單。

請注意：

- (1) 超過應報到時間30分鐘內才報到者，須等候其他人檢查完後才受檢。
 - (2) 超過應報到時間30分鐘未報到者，視為放棄，即當日不能受檢，須重新安排檢查日期。
2. 如需更改日期，請**至少提前一天**與檢查單位電話聯絡（07-3121101轉7152）。

請注意：檢查當日不接受更改，需再到門診由門診醫師重新預約。

3. 若有哺乳、懷孕情形或計畫懷孕時，請事先告訴櫃檯服務人員與醫療人員。
4. 若檢查當天同時有安排其他檢查，請事先來電告知（07-3121101轉7152），因有部分檢查項目不能與此檢查同一天進行，視情況可能需更改時間。
5. 檢查前並不需特別的準備，可正常用餐與服用常規藥物。
6. 接受核醫甲狀腺癌追蹤掃描時，在攝影過程維持姿勢不動，以保持檢查之正確性。

★ 檢查時間：

★ 放射藥劑：

銻99m硫化膠體 (Tc-99m sulfur colloid) 皮內注射



不用停藥
不用禁食

★ 檢查流程：

1. 櫃檯報到後，請至等候區等候，醫療人員將呼叫您的名字。請您至造影室。
2. 我們會在您大腳指及第二腳指間的部位或腫瘤相關部位進行皮內注射核醫藥物。
3. 雖然注射劑量非常微量（約0.3c.c.），但仍會有些疼痛，請忍耐。
4. 注射核醫藥物後，依醫療人員指示造影，依個人淋巴流速不同，造影時間亦有不同。通常會在注射後1小時與4小時各攝影一次，每次攝影時間約15分鐘。如有必要，依醫師指示在第二天加照[延遲相]影像。
5. 前哨淋巴定位患者與隔日或當日在開刀房由手術醫師協助取出淋巴結化驗



為了胎兒的健康
懷孕、哺乳或計畫懷孕
請先告知醫療人員

★ 檢查後注意事項：

請於檢查後三個工作天，自行約掛門診或依醫師原預約門診時間看檢查結果。



★ 其他注意事項：

1. 本檢查所用藥物雖具放射性，其半衰期只有6小時且非常微量，基本上並不會對您或家人造成傷害，請放心。但為嬰幼兒與孕婦、極嚴謹之安全考量，檢查當日請盡量減少近距離相處（一公尺以內稱近距離）。隔日則無此限制。
2. 銻99m硫化膠體 (Tc-99m sulfur colloid) 之物理半生期為6小時



有任何疑問歡迎與核醫科聯絡：

(07) 3121101轉7152