

★ 檢查目的：

經過臨床醫師的評估，想要進一步診斷您是否有腎血管性高血壓，因此為您安排了核醫腎血管性高血壓腎臟掃描。

★ 受檢者注意事項：

1. 請於約定日期及時間至檢查地點辦理報到候檢，報到時間請參閱預約通知單。

請注意：

- (1) 超過應報到時間30分鐘內才報到者，須等候其他人檢查完後才受檢。
 - (2) 超過應報到時間30分鐘未報到者，視為放棄，即當日不能受檢，須重新安排檢查日期。
2. 如需更改日期，請至少提前一天與檢查單位電話聯絡（07-3121101轉7152）。

請注意：檢查當日不接受更改，需再到門診由門診醫師重新預約。

3. 若有哺乳、懷孕情形或計畫懷孕時，請事先告訴櫃臺服務人員與醫療人員。
4. 若檢查當天同時有安排其他檢查，請事先來電告知（07-3121101轉7152），因有部分檢查項目不能與此檢查同一天進行，視情況可能需更改時間。
5. 檢查前並不需特別的準備，可正常用餐與服用常規藥物，但若您有使用ACEI類之降血壓藥物，需依指示停藥數天，檢查前30分鐘，須喝至少500毫升的水。
6. 接受核醫腎血管性高血壓檢查時，須注意在造影前解小便，而且在攝影過程維持姿勢不動，以保持檢查之正確性。

★ 檢查時間：

本檢查分為兩階段掃描，每次掃描約30分鐘

★ 放射藥劑：

鎇-99m DTPA(Tc-99m DTPA)：20毫居里，靜脈注射。



不用停藥
不用禁食

★ 檢查流程：

1. 櫃檯報到後，請至等候區稍候，輪到您時，醫療人員將呼叫您的名字，請至核醫掃描室靜脈注射核醫藥物：Tc-99m DTPA，注射後立即進行第一階段造影約30分鐘。
2. 第一次造影結束後，醫療人員會告知第二階段造影時間，並給您口服刻甫定（captopril）一或二顆，請於第二階段檢查時間前約一個小時服用刻甫定（captopril），服藥後30分鐘內，需喝至少三杯水。
3. 請依約定時間至掃描室報到，在核醫掃描室靜脈注射核醫藥物：Tc-99m DTPA，注射後立即進行第二階段造影約30分鐘。



為了胎兒的健康
懷孕、哺乳或計畫懷孕
請先告知醫療人員

★ 檢查後注意事項：

請於檢查後三個工作天，自行約掛門診或依醫師原預約門診時間看檢查結果。



★ 其他注意事項：

1. 本檢查所用藥物雖具放射性，其半衰期只有6小時且非常微量，基本上並不會對您或家人造成傷害，請放心。但為嬰幼兒與孕婦極嚴謹之安全考量之權益，檢查當日請盡量減少近距離相處（一公尺以內稱近距離）。隔日則無此限制。
2. 鎇-99m DTPA(Tc-99m DTPA)之物理半生期：6小時。



有任何疑問歡迎與核醫科聯絡：

(07) 3121101轉7152