

★ 檢查目的：

經過臨床醫師的評估，懷疑或確認您患有發炎、感染症狀或腫瘤相關的問題，因此為您安排了核醫銻-全身掃描主要目的為：

- (一)協助診斷發炎感染以及偵測不明原因發燒等潛藏性病灶。
- (二)偵測潛在性及原發性腫瘤，分期、治療的評估，療效追蹤與復發的監督。

★ 受檢者注意事項：

- 1.請於約定日期及時間至檢查地點辦理報到候檢，報到時間請參閱預約通知單。

請注意：

- (1)超過應報到時間30分鐘才報到者，須等候其他人檢查完後才受檢。
 - (2)超過應報到時間30分鐘未報到者，視為放棄，即當日不能受檢，須重新安排檢查日期。
- 2.核醫檢查所用藥劑均由國外進口，價格昂貴，如需更改日期，請至少提前一天與檢查單位電話聯絡(07-3121101轉7152)。

請注意：

- 檢查當日不接受更改，需再到門診由門診醫師重新預約。
- 3.若有哺乳、懷孕情形或計畫懷孕時，請事先告訴櫃台服務人員與醫療人員。
 - 4.檢查當天若同時安排其他檢查，請事先來電告知(07-3121101轉7152)，因有部分檢查項目不能與此檢查同一天進行，視情況可能須更改時間。
 - 5.檢查前並不需特別的準備，可正常用餐與服用常規藥物。
 - 6.造影前請先解清膀胱之尿液並清除身上所有金屬物品。
 - 7.接受全身掃描時，攝影過程應維持姿勢不動，以保持檢查之正確性。
 - 8.若有接受洗腎透析治療之受檢病患，請事先告知醫療人員。

★ 檢查時間：

本檢查分為第1天早上打針與第2天、第3天(或第4天)早上造影，每次造影的時間約20分鐘，全程需3至4天，請預留充分時間。

★ 放射藥劑：

銻-67檸檬酸鹽(Ga-67 Citrate)，靜脈注射。



不用停藥
不用禁食

★ 檢查流程：

- 1.櫃檯報到後，請至等候區等稍候，輪到您時，醫療人員將呼叫您的名字。請先至注射室接受靜脈注射放射性藥物：銻-67檸檬酸鹽(Ga-67 Citrate)。
- 2.注射核醫藥物後，再由醫療人員約定次日造影的時間。
- 3.依約定的時間至休息區等候造影，輪到您時，醫療人員將會呼叫您的名字並通知您先將小便解乾淨。造影檢查需時約20分鐘。
- 4.因部分檢查藥物會從腸胃道排出，因此星期二注射打針者，應於隔日星期三晚餐後1小時服用瀉劑；星期五注射打針者，應於星期日晚餐後1小時服用瀉劑，會有腹瀉、清腸作用，以利檢查。服用瀉劑後請禁食，但是仍可喝水與服用常規藥物。



為了胎兒的健康
懷孕、哺乳或計畫懷孕
請先告知醫療人員

★ 檢查後注意事項：

請於檢查結束後三個工作天，自行約掛門診或依醫師原預約門診時間看檢查結果。



★ 其他注意事項：

- 1.接受核醫銻-全身掃描時，須注意避免尿液或排泄物汙染到衣褲及皮膚，在造影前先解小便，若使用尿布請於造影前先行更換，而且在攝影過程盡量不動，以維持檢查之正確性。
- 2.本檢查所用藥物雖具放射性，其物理半衰期為3天(78小時)，有效生物半衰期約25天，基本上並不會對您或家人造成傷害，請放心。但為嬰幼兒與孕婦極嚴謹之安全考量，檢查當日請盡量減少近距離相處(保持一公尺以上距離)。檢查結束後則無此限制。



有任何疑問歡迎與核醫科聯絡：

(07) 3121101轉7152