

★ 檢查目的：

經過臨床醫師的評估，懷疑您可能有深部靜脈的問題，因此為您安排了核醫靜脈掃描的檢查，核醫靜脈掃描的主要目的為診斷是否有深部靜脈栓塞（包括手、足）。

★ 受檢者注意事項：

1. 請於約定日期及時間至檢查地點辦理報到候檢，報到時間請參閱預約通知單。

請注意：

- (1) 超過應報到時間30分鐘內才報到者，須等候其他人檢查完後才受檢。
- (2) 超過應報到時間30分鐘未報到者，視為放棄，即當日不能受檢，須重新安排檢查日期。

2. 如需更改日期，請至少提前一天與檢查單位電話聯絡（07-3121101轉7152）。

請注意：檢查當日不接受更改，需再到門診由門診醫師重新預約。

3. 若有哺乳、懷孕情形或計畫懷孕時，請事先告訴櫃臺服務人員與醫療人員。

4. 若檢查當天同時有安排其他檢查，請事先來電告知（07-3121101轉7152），因有部分檢查項目不能與此檢查同一天進行，視情況可能需更改時間。

5. 檢查前並不需特別的準備，可正常用餐與服用常規藥物。

6. 造影前，建議先用清水將腳洗乾淨，以便打針。

7. 接受核醫靜脈掃描時，攝影過程應維持姿勢不動，以保持檢查之正確性。

★ 檢查時間：40分鐘

★ 放射藥劑：

銻-99m紅血球間接標幟 (Tc-99m RBCs)



不用停藥
不用禁食

★ 檢查流程：

1. 櫃檯報到後，請至等候區等候，醫療人員將呼叫您的名字，先注射還原劑 (cold PYP)，15分鐘後會再通知您解小便（以免膀胱內尿液妨礙影像的判讀），再至掃描室，脫去鞋襪後平躺於檢查檯上。
2. 醫師會在您受檢部位（上肢或下肢）各綁兩條止血帶，由雙腳（或雙手）第一與第二趾間各打一針皮下注射，隨即開始造影；鬆開止血帶後再照一次。整個造影過程約需20分鐘左右。



為了胎兒的健康
懷孕、哺乳或計畫懷孕
請先告知醫療人員

★ 檢查後注意事項：

請於檢查後三個工作天，自行約掛門診或依醫師原預約門診時間看檢查結果。



★ 其他注意事項：

1. 皮下注射仍有些疼痛，請忍耐。
2. 造影時，機器會由腳部逐漸向腹部移動，請將手置於身側並保持不動。
3. 本檢查所用藥物雖具放射性，其半衰期只有6小時且非常微量，基本上並不會對您或家人造成傷害，請放心。但為嬰幼兒與孕婦極嚴謹之安全考量，檢查當日請盡量減少近距離相處（一公尺以內稱近距離）。隔日則無此限制。
4. 銻99m紅血球標幟 (Tc-99m RBCs) 之物理半生期為6小時。



有任何疑問歡迎與核醫科聯絡：

(07) 3121101轉7152