

# 泛得林定量噴霧吸入劑

## Ventolin® Inhaler

( Salbutamol 100 mcg/puff,  
200 puff/Bot )



衛教單內容



操作影片



高雄醫學大學附設中和紀念醫院

藥學部

## ★ 醫師為什麼會開此藥：

治療急性氣喘發作及其他相關症狀。

## ★ 此藥品該如何使用：

第 1 次使用，或超過一星期未用，請移除吸口蓋，充分振搖吸入劑後，空噴 2 次。



1. 輕壓蓋子左右兩側，往外拿開。

2. 將吸入劑上下搖動 10 次，使藥物均勻。



3. 請將吸入劑直立於姆指和食指之間，吸嘴在下。



4. 先對外吐一口氣後，將吸入劑開口含在口中，開始緩慢深吸氣並同時按壓吸入劑鐵罐，同時仍保持穩定且深的吸氣動作。



5.閉氣 5-10 秒鐘，然後恢復呼吸，若醫師指示吸入第二劑時，請間隔 30 秒後，再吸入下一劑。使用完畢蓋回蓋子。

使用吸藥輔助器的病人，不需閉氣，只要緊密罩住口鼻，自然呼吸 6-10 下，大約 20-30 秒，即可拿開面罩。

### ★ 使用此藥品該注意什麼：

- ✓ 對藥物會過敏者，須事先告知醫師或藥師。
- ✓ 需要時每次1~2個劑量，遵照醫師指示使用(一般一天以不超過8個劑量為原則)。
- ✓ 若使用該藥品的頻率增加，可能病情有變化，建議就醫治療。
- ✓ 藥品罐為加壓器，不可強力打開或暴露於50°C 以上之溫度，請勿擠壓、燃燒。
- ✓ 請勿將金屬罐放入水中。

## ★ 服藥後可能會出現的副作用：

肌肉輕微震顫、精神緊張、頭痛、暈眩、心跳過速、心悸。

## ★ 藥品該如何存放：

請放置在室溫的陰涼乾燥處，不建議放在過熱或陽光可照射到的地方。

## ★ 何時該更換藥品：

1. 請在吸入劑上貼一張紙，註明開始使用日期，及使用次數，例如以「正」字記號作標記。
2. 未開封的藥品總共有200個劑量，以200個劑量減去使用量（包括空噴的劑量），即可知剩餘可用次數。

參考文獻：廠商仿單

制定：104/10/01

修訂：115/04/30