


伯基 Bokey®
(Acetyl-salicylic acid
100 mg/Cap)



高雄醫學大學附設中和紀念醫院

藥學部

★ 醫師為什麼會開此藥：

具有抑制血小板凝集作用，可以防止血栓形成，用來預防心肌梗塞、短暫性缺血性發作、腦部缺血及腦中風發作。

★ 此藥品該如何使用：

1. 請依照醫師指示服藥，一般用法一天一粒，以開水吞服。

★ 使用此藥品該注意什麼：

- ✓ 對藥物會過敏者，須事先告知醫師或藥師。
- ✓ 曾有食道、胃、十二指腸潰瘍或有使用抗凝血劑之病患，須事先告知醫師或藥師。
- ✓ 該藥品不建議用於小於 18 歲的患者，或用於治療兒童、青少年罹患水痘或流行性感冒之症狀，可能會引起雷氏症候群。
- ✓ 手術(包括拔牙)或侵入性檢查前，請事先告知醫師正

在服用此藥品。

- ✓ 不要將您服用的藥品給家人或朋友服用。
- ✓ 若為管灌病人，請打開膠囊使用，勿再磨粉。避免破壞藥品腸溶微粒，增加胃腸不適副作用。

★ 服藥後可能會出現的副作用：

1. 可能會發生局部瘀青、出血、頭痛、心灼熱感、頭昏眼花、消化不良、腸胃不適、噁心、嘔吐、胃黏膜受損、潰瘍、虛弱等現象。
2. 若持續出現蕁麻疹、皮膚或牙齦出血、紫斑、血便等症狀，嚴重時需回院就診。

★ 忘了服藥怎麼辦：

當您想起時盡快補服一個劑量，若想起的時間已接近下次服藥時間，則不補服並繼續按照原時間服用下一次劑量即可，千萬不要服用雙倍劑量。

★ 懷孕或哺乳時該怎麼辦：

懷孕或哺乳婦女，請告知您的醫師。

★ 藥品該如何存放：

- ✓ 儲存於室溫乾燥處，避免陽光直射。
- ✓ 不要放在浴室、廚房或潮濕的地方，因為熱及水氣會使藥物變質。
- ✓ 不要存放過期或是很久不再使用的藥品，過期藥品就應丟棄。
- ✓ 為避免誤食，請將藥品放置在小孩不易拿取之處。

參考文獻：廠商仿單

制定：104/10/01

修訂：113/03/29