

戒必適
Champix[®]
(Varenicline)



高雄醫學大學附設中和紀念醫院

藥學部

★ 醫師為什麼會開此藥：

幫助戒菸。

★ 此藥品該如何使用：

1. 預設一個停止吸煙的日期，並且於預設日期前一週開始吃藥。

2. 依照醫師處方規則服藥，一次療程為 12 週。

3. 建議飯後以整杯水配合服藥。

★ 使用此藥品該注意什麼：

- ✓ 對藥物會過敏者，須事先告知醫師或藥師。
- ✓ 服用本藥期間切勿飲酒或併用鎮靜劑、安眠藥等。
- ✓ 若服藥期間出現癲癇、精神方面不良反應，請立即告知醫師。
- ✓ 避免開車或操作危險性機械等動作，注意行動安全，防止意外發生。

✓ 不要將您服用的藥品給家人或朋友服用。

★ 服藥後可能會出現的副作用：

初期服用藥物時可能會有噁心、便秘、睡眠障礙、脹氣與嘔吐等症狀，症狀持續或嚴重時請盡速就醫。

★ 忘了服藥怎麼辦：

當您想起時盡快補服一個劑量，若想起的時間已接近下次服藥時間，則不補服並繼續按照原時間服用下一次劑量即可，千萬不要服用雙倍劑量。

★ 懷孕或哺乳時該怎麼辦：

懷孕或哺乳婦女，請告知您的醫師。

★ 藥品該如何存放：

✓ 儲存於室溫乾燥處，避免陽光直射。

- ✓ 不要放在浴室、廚房或潮濕的地方，因為熱及水氣會使藥物變質。
- ✓ 為避免誤食，請將藥品放置在小孩不易拿取之處。



參考文獻：廠商仿單

制定：104/10/01
修訂：113/03/29