

欣婷凝膠 0.1% Adapalene Gel[®] 0.1%, (Adapalene)



高雄醫學大學附設中和紀念醫院

藥學部

★ 醫師為什麼會開此藥：

維他命 A 酸的類似物，治療尋常性痤瘡。

★ 此藥品該如何使用：

- ✓ 依醫師指示使用。
- ✓ 一天一次，在睡前使用，清潔患部後，使其保持乾燥，再塗擦薄薄一層凝膠治療。
- ✓ 塗擦時請避開眼、口、鼻；塗擦前後請清潔手部。

★ 使用此藥品該注意什麼：

- ✓ 對藥物會過敏者，須事先告知醫師或藥師。
- ✓ 本藥品勿使用於有傷口的皮膚（割傷或挫傷）或濕疹性皮膚。
- ✓ 用藥期間避免過度照射日光，外出時請注意防曬。
- ✓ 用量適當，用量過多會使副作用增大。
- ✓ 用藥期間，請勿更改使用頻率、或自行停藥。

★ 擦藥後可能會出現的副作用：

皮膚發紅、脫皮、刺激感；若持續發紅疼痛 2 至 3 天，請先暫停使用，必要時需回診。

★ 忘了用藥怎麼辦：

當您想起時盡快補用一次劑量，若想起的時間已接近下次擦藥時間，則不補用並繼續按照原時間使用下一次劑量即可，千萬不要使用雙倍劑量。(如果前一日睡前忘記塗藥，請於隔日睡前再塗藥即可，並不建議於白天睡醒後補塗藥物)

★ 懷孕或哺乳時該怎麼辦：

可能懷孕或哺乳的婦女請先與醫師討論。

★ 藥品該如何存放：

1. 請鎖緊瓶蓋，放置於陰涼乾燥處 ($<30^{\circ}\text{C}$)。
2. 請將藥品放置在小孩不易拿取之處。



參考文獻：廠商仿單

制定：104/10/01

修訂：113/03/29