

樂爾爽片 Donison[®]

(Prednisolone 5 mg/Tab)



高雄醫學大學附設中和紀念醫院

藥學部

★ 醫師為什麼會開此藥：

荷爾蒙補充、自體免疫疾病、消炎、過敏、氣喘。

★ 此藥品該如何使用：

遵照醫師指示服用，不可自行停用或更改劑量。

★ 使用此藥品該注意什麼：

若長期服用，請注意血壓與血糖控制、身高、體重與視覺的變化。

★ 服藥後可能會出現的副作用：

- ✓ 大部分副作用與劑量及服藥期間的長短有關係，通常停藥後會慢慢消失。
- ✓ 若以下症狀發生嚴重的情形或是無法消除時，請立即告知您的醫師：
腸胃不適、血壓上升、月亮臉、水牛肩、失眠、多毛症、四肢水腫、食慾增加、傷口癒合遲緩。

★ 忘了用藥怎麼辦：

當您想起時盡快補服一個劑量，若想起的時間已接近下次服藥時間，則不補服並繼續按照原時間服用下一次劑量即可，千萬不要服用雙倍劑量。

★ 懷孕或哺乳時該怎麼辦：

懷孕或哺乳婦女，請告知您的醫師。

★ 藥品該如何存放：

儲存於室溫乾燥處。





參考文獻：廠商仿單

制定：104/10/01

修訂：113/03/29