

二肽基肽酶 4 抑制劑類  
口服降血糖藥物  
(DPP-4 inhibitors)



高雄醫學大學附設中和紀念醫院

藥學部

## ★ 醫師為什麼開立此藥：

第 2 型糖尿病的輔助治療

## ★ 用法用量：

請遵照醫師指示服用，每次在相同的時間服用，不可隨便停藥亦不可隨便更改劑量。

## ★ 服藥注意事項：

1. 對本品之任何成份過敏的患者。
2. 不可用於第 1 型糖尿病之患者，或用於治療糖尿病酮酸血症。
3. 對孕婦的安全性仍然不明，因此懷孕期間並不建議使用，授乳的婦女也不建議使用。
4. 本藥單獨使用時，即使空腹也不會產生低血糖，但併用硫醯基尿素類藥物(Sulfonylureas)或胰島素時，低血糖的機會就會增加。若發生低血糖時，應立即服用葡



萄糖錠或葡萄糖水來治療。

5. 使用藥物之前需告知醫師是否有肝、腎等慢性疾病。

### ★ 忘記服藥時該怎麼辦？

當您想起時盡快補服一個劑量，若想起的時間已接近下次服藥時間，則不補服並繼續按照原時間服用下一次劑量即可，千萬不要服用雙倍劑量。

### ★ 此藥可能引起的副作用有哪些？如果發生了該怎麼辦？

| 可能的副作用                      | 如何處理  |
|-----------------------------|-------|
| 過敏反應(蕁麻疹、皮疹或血管神經性水腫)、咳嗽或喉嚨痛 | 請立即就醫 |

|  |   |
|--|---|
| <p>當併用其他降血糖用藥(如胰島素或硫醯基尿素類藥物(Sulfonylureas))，可能有低血糖症狀常：飢餓、頭暈、心跳加速、臉色蒼白、冒冷汗、說話困難、全身無力等</p> | <p>輕度時，立即吃糖果或含糖飲料，如未見改善，應立即送急診；嚴重低血糖發生痙攣、昏迷時，則不可進食，應立即送急診</p> |
| <p>腹痛、噁心、嘔吐、腹瀉</p>   | <p>如症狀持續，於就診時應告知醫師</p>  |

### ❖ 該如何儲存這個藥品？

請連同藥袋置於室溫之陰涼乾燥處，避免陽光直曬，並避免孩童誤拿。

參考文獻：廠商仿單

制定：104/10/01

修訂：113/03/29