

# 輔舒酮優氣吸入劑

## Flixotide<sup>®</sup> 50 evohaler

### ( Fluticasone 50 mcg/dose, 120 dose/bot )



衛教單內容



操作影片



高雄醫學大學附設中和紀念醫院

藥學部

## ★ 醫師為什麼會開此藥：

用於預防性治療成人及兒童氣喘，及使用支氣管擴張劑及皮質類固醇組合療法之病患。

## ★ 此藥品該如何使用：

1. 移開吸入器的塑膠蓋子，將吸入器直立於拇指與食指之間(吸口在下)，拇指放在底部。
2. 將噴霧吸入器上下搖動數次，確定內容物已混合均勻。
3. 臉轉向旁邊，先吐一口氣，再將輔助器含入口中，但不要咬它。



4. 深吸氣的同時，以食指按壓一次噴霧器，保持吸氣動作，將藥品緩慢的深吸到肺部。
5. 之後閉氣 5-10 秒鐘再恢復呼吸。
6. 需要使用第二個劑量，請間隔 30 秒鐘後再使用下一

劑。(重複步驟 2~5)

7. 每次使用完該藥品，記得要漱口，並深漱到喉嚨，之後將漱口水吐掉，避免喉嚨沙啞或念珠菌感染。
6. 第 1 次使用，或超過一星期未用，請先空噴兩次，確定可以使用後，再開始使用。

### ★ 使用此藥品該注意什麼：

- ✓ 對藥物會過敏者，須事先告知醫師或藥師。
- ✓ 藥品罐為加壓器，請勿擠壓、燃燒，不可將金屬罐自塑膠外殼中取出或放入水中。請將藥品保存於 30℃ 以下，避免冷藏或直接日曬。
- ✓ 此藥不能拿來當作急救用藥。

### ★ 服藥後可能會出現的副作用：

聲音嘶啞、發音困難、喉嚨刺激、頭痛、口腔及喉嚨的念珠菌感染、心悸。

### ★ 懷孕或哺乳時該怎麼辦：

如果您準備懷孕或已懷孕，應告知並與您的醫師討論。計劃授乳的婦女，請於開始用藥前告知您的醫師或藥師。

### ★ 忘了用藥怎麼辦：

當您想起時盡快補用一個劑量，若想起的時間已接近下次用藥時間，則不補用並繼續按照原時間使用下一次劑量即可，千萬不要使用雙倍劑量。

### ★ 藥品該如何存放：

請放置在室溫的陰涼乾燥處，不建議放在過熱或陽光可照射到的地方。

### ★ 何時該更換藥品：

1. 了解一罐可用次數，計算每日使用量，算出可使用天數，例如：120 個劑量，一天用兩次，就是可用 60 天，在瓶身上標示最後使用日期。
2. 若有使用藥品，就用正字標記記錄使用的次數，以 120 個劑量減去使用量(包括空噴的劑量)，即可知剩餘可用次數。

參考文獻：廠商仿單

制定：104/10/01

修訂：113/03/29