

愛妥糖錠

Actos[®]

(Pioglitazone 30mg/Tab)



高雄醫學大學附設中和紀念醫院

藥學部

醫師為什麼開立此藥：


第 2 型糖尿病的輔助治療

用法用量：

請遵照醫師指示服用，每天固定時間服藥較佳，不可隨便停藥亦不可隨便更改劑量。

服藥注意事項：

1. 不建議使用於有心臟衰竭症狀之病人。若有心衰竭症狀(包括體重快速增加、呼吸困難、水腫)，請告知醫師。
2. 開始治療前及治療後應定期檢測肝功能指數。
3. 為使糖尿病受到良好控制，請遵醫囑控制飲食與飲酒量，規律運動，並定期接受血糖、糖化血色素及尿糖檢查。



4. 服用本藥前，若有下列事項請先告知醫師：懷孕或準備懷孕、哺乳、曾有藥物過敏、其他疾病(心衰竭、肝疾病)，或同時服用其他藥物。
5. 此藥對停經前因具有胰島素阻抗而不排卵婦女可能造成恢復排卵的效果，所以需注意避孕。

忘記服藥時該怎麼辦？

發現忘記服藥時請盡快補服，若發現的時間已接近下次服藥時間就不補服，千萬不可服用雙倍的劑量。

此藥可能引起的副作用有哪些？該怎麼辦？

症狀	如何處理
尿液顏色變深、胃痛伴隨噁心嘔吐、食慾減退、皮膚或眼球顏色變黃	請立即就醫

<p>當併用其他降血糖用藥(如胰島素或磺醯基尿素類藥物(Sulfonylureas))，可能會有低血糖症狀：飢餓、頭暈、心跳加速、臉色蒼白、冒冷汗、說話困難、全身無力等</p>	<p>輕度時，立即吃糖果或含糖飲料，如未見改善，應立即送急診；嚴重低血糖發生痙攣、昏迷時，則不可進食，應立即送急診</p>
<p>腳或小腿腫脹</p>	<p>請儘速就醫</p>
<p>咳嗽、發燒、鼻塞、頭痛、喉嚨痛、肌肉痛</p>	<p>如症狀持續，於就診時應告知醫師</p>

該如何儲存這個藥品？

請連同藥袋置於室溫之陰涼乾燥處，避免陽光直曬，並避免孩童誤拿。

參考文獻：廠商仿單

制定：104/10/01
修訂：113/03/29