

志樂恆 Acarbose® (Acarbose 50mg/Tab)



高雄醫學大學附設中和紀念醫院

藥學部

★ 醫師為什麼會開此藥：

第二型糖尿病的輔助治療。減慢食物的消化，能使血糖在飯後不會升得很高。

★ 用法用量：

請遵照醫師指示服用，每次最好在相同的時間服用，不可隨便停藥亦不可隨便更改劑量。通常為飯前或飯中服用。

★ 服藥注意事項：

1. 開始治療應定期檢測肝功能指數。
2. 為使糖尿病受到良好控制，請遵醫囑控制飲食、飲酒量，檢查血糖、糖化血色素及尿糖，運動應規律。
3. 服用本藥前，若有下列事項請先告知醫師：懷孕或準備懷孕、哺乳、曾有藥物過敏、肝腎及其他疾病(腸道疾病如腸炎、腸阻塞應避免使用)。

★ 忘記服藥時該怎麼辦？

發現忘記服藥時請儘快補服，若發現的時間已接近下次服藥時間就不補服，按照原時間服用下一次劑量即可。千萬不可服用雙倍的劑量。

❖ 此藥可能引起的副作用有哪些？如果發生了該怎麼辦？

可能的副作用	如何處理
皮膚或眼白顏色變黃	請立即就醫
當併用胰島素或硫醯基尿素類藥物(Sulfonylureas)時，能會有低血糖症狀:飢餓、頭暈、心跳加速、臉色蒼白、冒冷汗、說話困難、全身無力等	輕度時，立即口服葡萄糖(蔗糖、醣類或果汁則不適用)，如未見改善，應立即送急診；嚴重低血糖發生痙攣、昏迷時，則不可進食，應立即送急診
脹氣、腹瀉、肚子不舒服(通常在治療的最初幾週會發生，一般會隨時間而減低次數及強度)	如症狀持續，於就診時應告知醫師

❖ 該如何儲存這個藥品？

請連同藥袋置於室溫之陰涼乾燥處，避免陽光直曬，並避免孩童誤拿。



參考文獻：廠商仿單

制定：104/10/01

修訂：113/03/29