

庫魯化錠

(Glucophage) 500mg/Tab



高雄醫學大學附設中和紀念醫院

藥學部

★ 醫師為什麼會開此藥：

第二型糖尿病的輔助治療。增加胰島素的敏感性，
加強胰島素的作用，以降低血糖。

★ 用法用量：

請遵照醫師指示服用，每次最好在相同的時間服用，不可隨便停藥亦不可隨便更改劑量。

★ 服藥注意事項：

1. 為使糖尿病受到良好控制，請遵醫囑控制飲食，運動應規律，檢查血糖、糖化血色素及尿糖，並定期做腎功能檢查。
2. 服藥期間避免飲酒過量。
3. 懷孕期間最好使用胰島素控制血糖。授乳時應告知醫師，由其決定停止授乳或停藥。
4. 於手術禁食期間暫時停藥。恢復進食後，且腎功能正

常時再恢復給藥。

5. 接受顯影劑檢查前，應告知醫生正在服用此藥物。

★ 忘記服藥時該怎麼辦？

發現忘記服藥時請儘快補服，若發現的時間已接近下次服藥時間就不補服，千萬不可服用雙倍的劑量。忘記服藥的時間可以記錄下來，待下次門診時再與醫師討論。

★ 此藥可能引起的副作用有哪些？如果發生了該怎麼辦？

1. 乳酸血症極少發生，但為極嚴重之副作用。於腎或肝功能不佳、缺氧、飲酒過度、脫水等病人較易發生。服藥一段時間後，如有不明之換氣過度、肌肉疼痛、不適或嗜眠症狀，應立即停藥或就診。
2. 單獨服用時，一般不會引起低血糖，但與硫醯基尿素類藥物、胰島素或酒精併用時，有可能會產生低血糖

(心悸、冒冷汗、極度飢餓感、頭痛、昏亂)。輕度時立即吃含糖飲料或食物，如果汁、糖水、方糖或糖果。如未見改善，則應送急診。如嚴重低血糖時發生痙攣、昏迷時，不可進食，應立即送急診。

3. 初期發生之胃腸不適，可由較低劑量逐漸增加用量或隨餐服用而減輕，通常連續服用後不適症狀會消失，但如嚴重腹瀉或嘔吐，則須暫時停藥。

☼ 該如何儲存這個藥品？

請連同藥袋置於室溫之陰涼乾燥處，避免陽光直曬，並避免孩童誤拿。

參考文獻：廠商仿單

制定：104/10/01
修訂：114/03/31