

樂多糖漿

Lactul syrup 60mL/Bot



高雄醫學大學附設中和紀念醫院

藥學部

★ 醫師為什麼會開此藥：

可以治療慢性便秘或降低血中氨的濃度或嚴重肝病引起的昏迷。

★ 此藥品該如何使用：

請遵照醫師的指示。

★ 使用此藥品該注意什麼：

1. 因為藥物含有少量的半乳糖和乳糖，建議乳糖不耐症的病人小心使用，糖尿病病人定期監測血糖。
2. 如果便秘治療數天後沒有改善，請告訴您的醫師。
3. 若您有腸阻塞的問題，不要使用。
4. 若有腹瀉及腹痛時，應立即停藥。
5. 可與果汁白開水牛奶混合後使用。

★ 忘了用藥怎麼辦：

1. 當您想起忘記服藥時，盡快補服一個劑量。
2. 若想起的時間已接近下次服藥時間，請跳過這一次劑量，並繼續按照原時間再服用下一次劑量。
3. 切記千萬不要一次服用雙倍劑量。

★ 用藥後可能會出現的副作用：

腹瀉、脫水、脹氣及腹痛。

★ 懷孕或哺乳時該怎麼辦：

如果您準備懷孕或已懷孕，應告知並與您的醫師討論。計劃授乳的婦女，請於開始用藥前告知您的醫師或藥師。



★ 藥品該如何存放：

1. 此藥室溫(15~30°C)儲存即可。但請置於乾燥、陰涼、陽光不會直接照射的地方，並避免孩童誤食。
2. 置於室溫良好條件貯存下，顏色變深不影響療效；長期置於30度以上，顏色會變極深、混濁，請勿再使用。
3. 長期置於冷凍溫度時，呈半固體狀、變稠、不易倒出，但恢復至室溫時，即可恢復原狀，不影響療效。



參考文獻：廠商仿單

制定：104/10/01

修訂：113/03/29