

摩舒胃清膜衣錠
Mopride® F.C.
(Mosapride 5 mg/Tab)



高雄醫學大學附設中和紀念醫院

藥學部

★ 醫師為什麼會開此藥：

腸胃蠕動不良及其他相關症狀(如：心灼熱、噁心、嘔吐)。

★ 此藥品該如何使用：

- ✓ 請依照醫師指示服藥，固定飯前或飯後服用均可。
- ✓ 切勿擅自停藥或增加藥量。

★ 使用此藥品該注意什麼：

- ✓ 對此藥物過敏，或有心跳不正常、腸胃道出血、阻塞或穿孔等病史時，應先告知醫師。

★ 服藥後可能會出現的副作用：

- ✓ 頭暈、頭痛、胃腸不適、過敏等，若症狀持續，請告知醫師。

★ 忘了用藥怎麼辦：

當您想起時盡快補服一個劑量，若想起的時間已接近下次服藥時間，則不補服並繼續按照原時間服用下一次劑量即可，千萬不要服用雙倍劑量。

★ 懷孕或哺乳時該怎麼辦：

懷孕或哺乳婦女，請告知您的醫師。

★ 藥品該如何存放：

儲存於室溫乾燥處。





參考文獻：廠商仿單

制定：104/10/01

修訂：113/03/29