

尼古丁貼片



高雄醫學大學附設中和紀念醫院

藥學部

★ 醫師為什麼會開此藥：

輔助戒菸用藥。

★ 此藥品該如何使用：

✓ 使用方式：

1. 使用時間/依個人需要，可選擇在早上或晚上沐浴後擦乾身體再使用。
2. 在使用前才將貼片自鋁箔袋取出（並且撕下舊的貼片）。
3. 每天貼不同的位置：貼在上半身，沒有皺折、毛髮的地方（如背部、胸部、手臂）
4. 一天貼一片，黏貼後請壓住貼片十秒。
5. 使用貼片後請立即洗手，以免手部碰到口鼻等而受到刺激。
6. 使用後貼片應對折或包裹完全後丟棄。

★ 使用此藥品該注意什麼：

- ✓ 不可貼在有傷口或疼痛之皮膚處，同一部位至少需隔7天才能再貼。

- ✓ 貼藥部位毛髮剪除（勿用刮除方式，以免傷口產生），用清水清潔（不要用清潔劑、乳液等可能會產生皮膚刺激或改變膚質之物品）。
- ✓ 使用貼片期間不可抽菸，治療期間不可超過3個月。
- ✓ 貼片為鋁箔含鋁材質，請勿於進行核磁共振攝影(MRI)時貼著貼片，避免因掃描過程中過熱造成皮膚灼傷。
- ✓ 此貼片僅限病人自己使用，不要將您使用的貼片給家人或朋友使用，以免發生危險。

★ **忘了用藥怎麼辦：**

當您想起時盡快補貼一個貼片，若想起的時間已接近下次用藥時間，則不使用並繼續按照原時間使用下一次貼片即可，千萬不要使用雙倍劑量。

★ **懷孕或哺乳時該怎麼辦：**

懷孕或哺乳婦女，請告知您的醫師。

★ **服藥後可能會出現的副作用：**

1. 貼片移除後貼片下皮膚會赤紅一天，若持續或紅腫，則可能是過敏反應。
2. 可能會心跳增加、血壓改變、噁心、便秘、睡眠障礙、腹脹、腹瀉與暈眩等症狀，若無法忍受不良反應，應

該儘快回診與醫師討論。

★ 藥品該如何存放：

1. 儲存於室溫乾燥處，避免陽光直射。
2. 不要放在浴室、廚房、車內或潮濕的地方，因為熱及水氣會使藥品變質。
3. 為避免誤用，請將藥品放置在小孩不易拿取之處。



參考文獻：廠商仿單

制定：104/10/01

修訂：113/03/29