

# 硝酸甘油 (Nitroglycerin)

## 耐絞寧錠



高雄醫學大學附設中和紀念醫院

藥學部

✪ 醫師為什麼會開此藥：

用於緩解心絞痛的急性症狀。


✪ 用法用量：

舌下錠於胸痛發作時含一粒於舌下，不可嚼碎或整粒吞服，讓藥錠於舌下慢慢溶化，含藥時應坐下，以免發生暈眩而跌倒。若舌下含藥五分鐘後，胸痛沒有改善或持續惡化，可含第二顆，並儘快送醫（建議打 119 叫救護車，不可自行開車），過五分鐘後仍不舒服可含第三顆，總服用顆數不可超過三粒。

✪ 服藥注意事項：

- ✓ 硝酸甘油舌下錠，為確保其藥效，請保存於原瓶內，不可分裝，取用後請儘速拴緊瓶蓋，避免降低藥效。

- ✓ 請隨身攜帶硝酸甘油錠(如隨身包內)，不要放在貼身處(如胸前口袋)，因高溫可能影響藥效，並定期檢查有效期限，防止藥品過期失效。
- ✓ 請勿與 Cialis (犀利士)、Levitra (樂威壯)或 Viagra (威而鋼) 併用。避免飲酒。
- ✓ 硝酸甘油可能引起頭暈，從事危險性工作(如開車、操作機械)時應小心。
- ✓ 請隨時確認您手邊的藥量是否足夠，尤其是假期前或旅行前。
- ✓ 以前曾因使用硝酸鹽製劑而引起不良反應者，請先告知醫師。
- ✓ 請勿讓別人使用您的藥品。



★ 此藥可能引起的副作用有哪些？如果發生了該怎麼辦？

- ✓ 若出現眩暈、虛弱、昏倒、心跳快速的情況，請立刻躺下或坐下，若症狀持續，請立即就醫。
- ✓ 若持續出現胃不舒服、眼花、口乾、皮疹等症狀，嚴重時請立即就醫。

★ 該如何儲存這個藥品？

- ✓ 為避免誤食，請置於兒童拿不到的地方。
- ✓ 藥品應置於陰涼乾燥並避免陽光直接照射，亦不要放置在曝曬的汽車中。
- ✓ 如發現藥品過期或潮解則應丟棄，回診時請醫師開立新的藥品。

參考文獻：廠商仿單

制定：104/10/01  
修訂：113/03/29