

萬博黴素 Amolin[®] (Amoxicillin 50 mg/mL, 60 mL/Bot)



高雄醫學大學附設中和紀念醫院

藥學部

★ 醫師為什麼會開此藥：

感染及其他相關症狀。

★ 此藥品該如何使用：

✓ **配製方式**：慢慢加入冷開水將藥粉溶解搖勻，最終加水至瓶身刻度 60 mL。

✓ 每次使用前請先搖晃均勻再使用。

✓ 請遵照醫師指示，於正確時間服藥，不可隨便停藥或更改劑量。

★ 使用此藥品該注意什麼：

✓ 對藥物會過敏者，須事先告知醫師或藥師。

✓ 不可將您服用的藥品給您的家人或朋友服用。

★ 服藥後可能會出現的副作用：

✓ 若以下症狀發生嚴重的情形或是無法消除時，請立即通知您的醫師：腸胃道不適（可與食物一起

服用來緩解症狀)、腹瀉、過敏等。

★ 忘了用藥怎麼辦：

當您想起時盡快補服一次劑量，若想起的時間已接近下次服藥時間，則不補服並繼續按照原時間服用下一次劑量即可，千萬不要服用雙倍劑量。

★ 藥品該如何存放：

1. **尚未泡製的藥品**：請放置於陰涼乾燥處。
2. **已經泡製好的藥品**：請蓋緊瓶蓋，儲存於冰箱冷藏，可保存7天。
3. 請將藥品放置在小孩不易拿取之處。



參考文獻：廠商仿單

制定：104/10/01
修訂：113/03/29