

# 康纖散劑

## KOCEL 6g/Pack



高雄醫學大學附設中和紀念醫院

藥學部

## ★ 醫師為什麼會開此藥：

用於治療慢性便秘及其他相關症狀。

## ★ 此藥品該如何使用：

- ✓ 請將藥品倒到嘴裡，勿咀嚼或壓碎，再配以充足之開水(至少 250ml 的開水)吞服，以免在食道或腸道造成阻塞。
- ✓ 也可以和果汁或牛奶一起使用，掩蓋藥物不好的味道。
- ✓ 用藥治療期間，請每天喝至少 6~8 杯(250ml/杯)的開水或果汁。

## ★ 使用此藥品該注意什麼：

- ✓ 對藥物會過敏或盲腸炎、腸阻塞、不明原因腹痛、吞嚥困難的病人，須事先告知醫師或藥師。
- ✓ 未經醫生指示，禁用於六歲以下的孩童。



- ✓ 不可以將藥品加入水中沖泡，藥品會吸水膨脹，不易食用。
- ✓ 該藥品請於飯後服用，不建議睡前服用，尤其是老年人。
- ✓ 不宜長期使用。若服藥 4 天仍未排便，請停止使用並告知醫師。

### ★ 服藥後可能會出現的副作用：

- ✓ 若以下症狀發生嚴重的情形或是無法消除時，請立即通知您的醫師：皮膚發疹或紅腫、吞嚥困難、腹絞痛、腹瀉、打嗝、噁心、心悸、嚴重便秘等。

### ★ 忘了用藥怎麼辦：

當您想起時盡快補服一個劑量，若想起的時間已接近下次服藥時間，則不補服並繼續按照原時間服用下一次劑量即可，千萬不要服用雙倍劑量。

## ★ 懷孕或哺乳時該怎麼辦：

如果您準備懷孕或已懷孕，應告知並與您的醫師討論。計劃授乳的婦女，請於開始用藥前告知您的醫師或藥師。

## ★ 貼心小叮嚀：

- ✓ 請將本藥品放置於室溫陰涼乾燥處避光儲存，請勿冷藏或冷凍。請勿放在孩童可以取得的場所。
- ✓ 爲了幫助便秘緩解，每天至少喝 6-8 杯的水，配合運動及多食用高纖飲食。

參考文獻：廠商仿單

制定：104/10/01

修訂：115/04/30