

柔糖錠(Repaglinide)

1mg/Tab



高雄醫學大學附設中和紀念醫院

藥學部

★ 用法用量：

1. 請遵照醫師指示服用，每次最好在相同的時間服用，不可隨便停藥亦不可隨便更改劑量。
2. 通常在每次正餐前 15-30 分鐘內服用。

★ 服藥注意事項：

1. 為使糖尿病受到良好控制，請遵醫囑控制飲食、飲酒量，應定時檢查血糖、糖化血色素及尿糖，運動應規律。
2. 服用本藥前，若有下列事項請先告知醫師：懷孕或準備懷孕、哺乳、曾有藥物過敏、其他疾病(肝臟、腎臟、心臟、腎上腺或腦下垂體病變等疾病)，或同時服用其他藥物，讓醫師決定是否應用藥；孕婦的糖尿病，一般應以胰島素控制。

★ 忘記服藥時該怎麼辦？

發現忘記服藥時請儘快補服，若發現的時間已接近下次服藥時間就不補服，千萬不可服用雙倍的劑量。

★ 此藥可能引起的副作用有哪些？

如果發生了該怎麼辦？

可能的副作用	如何處理
流鼻水、鼻塞、咳嗽、喉嚨痛、胸痛或呼吸急促	請儘速就醫
低血糖(通常血糖低於 70 mg/dL)：飢餓、頭暈、心跳加速、臉色蒼白、冒冷汗、說話困難、全身無力等	如發生低血糖症狀，應立即補充下列任一項食物：果汁或糖水、糖果或方糖、糖包、葡萄糖片。 如未見改善，應立即送急診

嚴重低血糖發生痙攣、昏迷時	不可進食，並立即送急診
腹痛、腹瀉、噁心、嘔吐、便秘、背痛或關節痛	通常症狀是輕微且暫時的，如症狀持續，於就診時應告知醫師

參考文獻：廠商仿單

制定：104/10/01

修訂：113/03/29