


抗血小板藥物 P2Y₁₂ 抑制劑



高雄醫學大學附設中和紀念醫院

藥學部

❖ 本院藥品品項：

學名	商品名	劑量	藥品外觀
Clopidogrel	Plavix 保栓通錠	75mg/tab	粉紅色/圓形/錠劑/75
Ticagrelor	Brilinta 百無凝錠	90mg/tab	黃色/圓形/錠劑/90 T
		60mg/tab	粉紅色/圓形/錠劑/60 T
Prasugrel	Efient 抑凝安錠	5mg/tab	土黃/橢圓形/錠劑/日文 藥名與數字 5/剝痕
		3.75mg/tab	粉紅色/橢圓形/錠劑/日 文藥名與數字 3.75

❖ 為什麼要服用此藥品：

防止血小板凝集，降低血栓發生的機會，減少血管阻塞、心肌梗塞、中風發生的風險、亦可減少支架栓塞的發生。

❖ 該如何使用此藥品：

請依照醫師指示服藥，請勿自行停藥、自行增加或減少藥物劑量。

❖ 使用藥品後可能會出現的副作用：

- 1.若有輕微出血症狀，如瘀青、鼻出血、牙齦出血等，或輕微呼吸不順暢，建議諮詢醫師或藥師。
- 2.若發生過敏（包括皮疹與搔癢）、胸痛胸悶、呼吸困難、不正常出血情況（如出血不止、血便血尿、咳血或吐血），請立即就醫。

3.副作用並非每個人都會發生，請勿過於擔心。

★ **忘記服藥怎麼辦：**

當您想起時，盡快補服一個劑量。

若想起的時間已接近下次服藥時間，則不補服並繼續按照原時間服用下一次劑量即可，千萬不要服用雙倍劑量。

★ **懷孕或哺乳時該怎麼辦：**

準備/可能懷孕或哺乳的婦女，請告知您的醫師。

★ **藥品該如何存放：**

1. 儲存於室溫乾燥處（30℃以下），避光保存。
2. 避免放在孩童可以取得的場所。
3. 若藥品超過保存期限請丟棄。
4. 請勿將您的藥物提供給他人使用。

★ **藥師的叮嚀：**

1. 必須每日定時服用藥品。
2. 安排拔牙、手術、侵入性檢查前，請告知手術醫師有服用抗血小板藥物，並於回診時告知開藥醫師。
3. 請勿自行使用消炎止痛藥、酒精，可能影響藥效。
4. 避免大量飲用含酒精性飲料和葡萄柚汁，若不確定其他併用藥品是否會與此藥產生交互作用時，請詢

問醫師或藥師。

5. 服藥前，請確實告知醫師是否曾有出血問題（不正常瘀血或流鼻血現象或經期過長）、中風、肝疾病、癲癇、關節炎、藥物過敏等問題。
6. 若您正在服用其他抗血小板藥物、抗凝血劑、大蒜、人參、銀杏、止痛藥或維他命E等與活血相關保健食品，就診時，請確實告知醫師。
7. 讓所有照顧您的醫療人員知道您正服用此藥。
8. 應盡量避免從事易引起外傷之危險活動。
9. 避免割傷自己，小心使用牙刷或刮鬍刀，盡量選擇軟毛牙刷或電動刮鬍刀。
10. 確定身邊有足夠藥量，並遵循醫師指示服藥。
11. 請勿自行更換不同廠牌之藥品。
12. 若有不正常出血情況（如鼻出血、糞便顏色突然變深或刷牙有血絲等），請立即告知您的主治醫師或就近就醫。

參考文獻：廠商仿單

制定：104/10/01

修訂：113/03/29