

# 陰道栓劑



Lomexin vaginal soft cap. 200mg  
洛徽欣陰道軟膠囊 200毫克



Esvatin VT 0.5mg/Tab  
薇詩婷陰道錠



高雄醫學大學附設中和紀念醫院版權所有 110-074製



高雄醫學大學附設中和紀念醫院

藥學部

## ★ 醫師為什麼會開此藥：

治療子宮頸糜爛、陰道炎、白帶及其他相關症狀。

## ★ 此藥品該如何使用：

1. 使用前先將雙手洗乾淨。
2. 除去栓劑的外包裝。
3. 可用溫水將栓劑濕潤一下，以利於使用。
4. 患者採仰臥姿勢，小腿屈起，膝蓋朝上，將藥輕輕塞入陰道內，約兩個食指指節深。
5. 最好在夜間睡前用藥，可使藥品停留時間延長，而提高療效。

## ★ 使用此藥品該注意什麼：

- ✓ 對藥物會過敏者，須事先告知醫師或藥師。
- ✓ 治療期間，即使症狀改善，請勿擅自停藥，完成整個療程才能根治。

✓ 感染用藥期間應避免行房，或請男性使用保險套，  
以防止二度感染。

✓ 感染治療期間，避免使用刺激性清潔用品。

### ★ 用藥後可能會出現的副作用：

治療初期會有局部刺激作用，但通常迅速地消退。

### ★ 懷孕或哺乳時該怎麼辦：

如果您準備懷孕或已懷孕，應告知並與您的醫師討論。計劃授乳的婦女，請於開始服藥前告知您的醫師或藥師。

### ★ 忘了用藥怎麼辦：

當您想起時盡快補用一個劑量，若想起的時間已接近下次用藥時間，則不補用並繼續按照原時間使用下一次劑量即可，千萬不要使用雙倍劑量。

## ★ 貼心小叮嚀：

- ✓ 使用前後請將雙手洗乾淨，避免再次感染。
- ✓ 請放置在室溫的陰涼乾燥處，若栓劑變軟，可置放於冷水或冰箱中，待變硬後再使用；並避免孩童誤拿。
- ✓ 防止栓劑溶解後滲出而汙染衣物，建議可以使用衛生棉墊。
- ✓ 沒有過性行為的患者，勿使用陰道栓劑。
- ✓ 治療期間若遇到生理期，由於藥品特性不同，請詢問醫師或藥師是否繼續使用。

參考文獻：廠商仿單

制定：104/10/01

修訂：113/03/29