

# 來喜妥口服錠 Rasitol® ( Furosemide 40 mg/Tab )



高雄醫學大學附設中和紀念醫院

藥學部

## ★ 醫師為什麼會開此藥：

水腫、高血壓及其他相關症狀。

## ★ 此藥品該如何使用：

- ✓ 請遵照醫師和藥師指示，不可隨便停藥或更改劑量。

## ★ 使用此藥品該注意什麼：

- ✓ 避免在睡前服用（最好白天使用），可防止夜間頻繁如廁而影響睡眠。
- ✓ 控制鹽分的攝取，不吃太鹹。
- ★ 服藥後可能會出現的副作用：
  - ✓ 開始治療時可能發生起立性低血壓，應放慢起身站立的動作，以防止頭昏情況出現。
  - ✓ 頻尿，最好白天使用。

- ✓ 若持續發生以下症狀，嚴重時請立即通知醫師：  
暈眩、意識模糊、頭痛、多汗、發燒、體重急速  
下降、皮膚紅疹、抽筋、肌無力。

### ★ 忘了用藥怎麼辦：

當您想起時盡快補服一個劑量，若想起的時間已接近下次服藥時間，則不補服並繼續按照原時間服用下一次劑量即可，千萬不要服用雙倍劑量。

### ★ 懷孕或哺乳時該怎麼辦：

- ✓ 懷孕或哺乳婦女，請告知您的醫師。

### ★ 藥品該如何存放：

- ✓ 儲存於室溫乾燥處
- ✓ 請將藥品放置在小孩不易拿取之處。



參考文獻：廠商仿單

制定：104/10/01

修訂：113/03/29