

羅可坦軟膠囊

Roaccutane®

(Isotretinoin 10 mg/Cap)



高雄醫學大學附設中和紀念醫院

藥學部

★醫師為什麼會開此藥：

治療嚴重性痤瘡，皮膚、口腔、眼睛病變及其他相關症狀。

★此藥品該如何使用：

- ✓ 服藥的劑量及治療期間長短，會依個人的病情不同而有調整，請依醫師指示服藥，請勿自行停用藥物，或更改藥物使用劑量。
- ✓ 此藥品一般一天使用一~二次，請與食物併服(效果較佳)。
- ✓ 此藥品在治療的初期症狀可能無明顯改善或有暫時性的惡化，但持續接受治療約 16~24 週後，症狀將獲得改善。

★使用此藥品該注意什麼：

- ✓ 對藥物會過敏者，須事先告知醫師或藥師。
- ✓ 有併服其他抗生素或維他命 A 的藥物，須事先告知醫師或藥師。
- ✓ 若有糖尿病、高血脂、肝臟疾病、胰臟炎及其他病史者需使用，須事先告知醫生或藥師。
- ✓ 該藥品經由肝臟代謝，因此治療前一個月及之後每三個月須再檢查肝功能。

- ✓ 若您準備懷孕或計畫懷孕，請事先告知您的醫生，請於治療前一個月、治療期間、治療後一個月做好避孕措施，避免受孕。
- ✓ 在服藥期間及停藥後一個月內，請勿捐血，以避免輸血給懷孕婦女。
- ✓ 此藥品不會影響男性生育力，也不會影響精子形成受精卵與發育。
- ✓ 服藥期間請避免日曬，並作好防曬措施，服藥期間及停藥後六個月內應避免以蠟、雷射除毛，以免造成皮膚剝落、留下疤痕或引起皮膚炎的可能。
- ✓ 此藥品可能會升高血中的三酸甘油脂，因此治療後須定期抽血監測。
- ✓ 此藥可能引起眼睛乾燥、眼睛敏感、夜間視力降低，因此配戴隱形眼鏡、開車或從事警覺性工作者請特別小心。

★ 服藥後可能會出現的副作用：

- ✓ 可能出現皮膚乾燥、嘴唇乾燥、流鼻血、眼睛乾燥、毛髮稀少、憂鬱、腹瀉等症狀，建議可以使用乳液、護唇膏、人工淚液等物品改善。
- ✓ 出現嚴重腹痛、骨頭痛、肌肉痛、頭痛的情形，請

回院就診。

★ **忘了用藥怎麼辦：**

當您想起時盡快補服一個劑量，若想起的時間已接近下次服藥時間，則不補服並繼續按照原時間服用下一次劑量即可，千萬不要服用雙倍劑量。

★ **懷孕或哺乳時該怎麼辦：**

- ✓ 懷孕或哺乳婦女避免使用此藥(該藥品有高度致畸胎風險)。
- ✓ 如在服藥期間，發現已懷孕，應立即停止服用，並盡快通知醫師。

★ **藥品該如何存放：**

- ✓ 儲存於室溫乾燥處，避免陽光直接照射。
- ✓ 請將藥品放置在小孩不易拿取之處，避免小孩不慎服用。

參考文獻：廠商仿單

制定：104/10/01

修訂：113/03/29