

# 使肺泰優氣吸入劑

## Seretide® Evohaler

### Salmeterol/Fluticasone, 120 dose/Bot



衛教單內容



操作影片



高雄醫學大學附設中和紀念醫院

藥學部

## ★ 醫師為什麼會開此藥：

治療呼吸道阻塞疾病，及使用支氣管擴張劑及皮質類固醇組合療法之病患。

## ★ 此藥品該如何使用：

### 第 1 次使用：

請移除吸口蓋，充分振搖吸入劑後，空噴至計數器顯示為「120」；或超過一星期未用，請充分振搖後先空噴兩次，再使用。

### 使用方法：

1. 移開吸入劑的塑膠蓋子，裝上白色半透明的輔助器。將吸入劑直立於拇指與食指之間(吸口在下)，拇指放在底部。
2. 將吸入劑上下搖動約10下，先吐一口氣，再將輔助器含入口中。



3. 深吸氣的同時，以食指按壓一次吸入劑，將藥品緩慢地深吸到肺部。

4. 之後閉氣 5-10 秒鐘再恢復呼吸，若需要使用第 2 劑，請間隔 30 秒鐘後再使用下一劑。(重複步驟 2~4)
5. 每次吸藥後，請用清水漱口，可以減少口腔或喉嚨疼痛、感染、聲音沙啞的情況。漱口方式：每次使用完，把頭後仰，深漱至喉嚨，並將漱口水吐掉，重複 3 次。

### ★ 使用此藥品該注意什麼：

- ✓ 對藥物會過敏者，須事先告知醫師或藥師。
- ✓ 輔助器需時常保持清潔，可用清水清洗後陰乾，但勿用刷子刷洗。
- ✓ 藥品罐為加壓器，不可強力打開或暴露於 50°C 以上之溫度，請勿擠壓、燃燒，並不可將金屬罐自塑膠外殼中取出或放入水中。
- ✓ 此藥不能拿來當作急救用藥。

### ★ 服藥後可能會出現的副作用：

聲音嘶啞、發音困難、喉嚨刺激、頭痛、口腔及喉嚨的念珠菌感染、心悸。

### ★ 懷孕或哺乳時該怎麼辦：

如果您準備懷孕或已懷孕，應告知並與您的醫師討論。計劃授乳的婦女，請於開始用藥前告知您的醫師或藥師。

### ★ 忘了用藥怎麼辦：

當您想起時盡快補用一個劑量，若想起的時間已接近下次用藥時間，則不補用並繼續按照原時間使用下一次劑量即可，千萬不要使用雙倍劑量。

### ★ 藥品該如何存放：

請放置在室溫的陰涼乾燥處，不建議放在過熱或陽光可照射到的地方。

### ★ 何時該更換藥品：

1. 當計數視窗顯示“020”時，就應考慮換新的。當計數視窗顯示“000”時，就一定要換新，此後任何按壓所噴出的藥量可能無法給予病患完整劑量。

參考文獻：廠商仿單

制定：104/10/01

修訂：113/03/29