思麗安乳膏
Skinoren cream ®20%, 30g/Tube
(Azelaic acid 20%)

高雄醫學大學附設中和紀念醫院

藥學部

✪ 醫師為什麼會開此藥：

治療痤瘡(粉刺)、色素沉澱及其他相關症狀。

✪ 此藥品該如何使用：

✓ 依醫師指示使用。

✓ 一天兩次，在清潔患部後，再塗擦薄薄一層乳膏治療。

✓ 塗擦時請避開眼、口、鼻；塗擦前後請清潔手部。

✪ 使用此藥品該注意什麼：

✓ 對藥物會過敏者，須事先告知醫師或藥師。

✓ 此藥品僅供外用，請避免接觸到眼睛，若不慎發生，請用大量清水沖洗。

✓ 用量請適當，因用量過多會使副作用增大。

✓ 非經醫師指示，請勿更改使用頻率、或自行停藥。

✪ 擦藥後可能會出現的副作用：

可能會有皮膚灼熱、發紅、搔癢、刺激感等不適症狀，隨著治療期間會逐漸改善。

✪ 忘了用藥怎麼辦：

當您想起時盡快補用一次劑量，若想起的時間已接近下次擦藥時間，則不補用並繼續按照原時間使用下一次劑量即可，千萬不要使用雙倍劑量。

✪ 懷孕或哺乳時該怎麼辦：

可能懷孕或哺乳的婦女，請告知您的醫師。

✪ 藥品該如何存放：

1. 請鎖緊瓶蓋，放置於陰涼乾燥處（＜30℃），避免陽光直接照射。
2. 請將藥品放置在小孩不易拿取之處。

參考文獻：廠商仿單

制定：104/10/01

修訂：114/03/31