


Angiotensin II receptor antagonists (ARB)

血管收縮素受體拮抗劑

降血壓藥物



高雄醫學大學附設中和紀念醫院

藥學部

★ 本院藥品品項：

學名	商品名	劑量	藥品外觀
Valsartan	Diovan 得安穩錠	40mg/tab	黃色/橢圓形/錠劑 /DO/NVR/剝痕
		160mg/tab	土黃/橢圓形/錠劑/DX DX/NVR/剝痕
Azilsartan	Edarbi 易得平錠	40mg/tab	白色/圓形/錠劑 /ASL/40

其餘複方藥品：如 Co-aprovel 可普諾維錠、Co-diovan 可得安穩錠、Exforge 易安穩膜衣錠、Exforge HCT 力安穩膜衣錠、Sevikar 舒脈康膜衣錠、Sevikar HCT 舒脈優膜衣錠

★ 為什麼要服用此藥：

降低血壓，減少水分滯留，降低心臟負荷，因此具有保護心臟及腎臟的功用。

★ 該如何使用此藥品：

請依照醫師指示服藥，請勿自行停藥、自行增加或減少藥物劑量。

★ 忘記服藥怎麼辦：

當您想起時，盡快補服一個劑量。

若想起的時間已接近下次服藥時間，則不補服並繼續按照原時間服用下一次劑量即可，千萬不要服用雙倍劑量。

✪ 使用藥品後可能會出現的副作用：

1. 乾咳、味覺改變（例如：口中出現金屬味或酸味），服用一段時間後，如果持續乾咳，請告知醫師。
2. 出現手腳、臉、舌頭腫脹現象，必須馬上就醫。
3. 副作用並非每個人都會發生，請勿過於擔心。

✪ 懷孕或哺乳時該怎麼辦？

準備/可能懷孕或哺乳的婦女，請告知您的醫師。

✪ 該如何儲存這個藥品？

1. 儲存於室溫乾燥處（30 °C 以下），避光保存。
2. 避免放在孩童可以取得的場所。
3. 若藥品超過保存期限請丟棄。
4. 請勿將您的藥物提供給他人使用。

✪ 藥師叮嚀：

1. 對藥物過敏、有腎臟、肝臟、心臟血管方面疾病或糖尿病患者，請先告知醫師或藥師。
2. 服藥期間，建議每天固定時間監測血壓與脈搏並記錄，回診時可提供給醫師評估。
3. 服藥期間會使血壓下降，更換姿勢時可能出現頭暈不適情形，建議由躺姿或坐姿起身時，請放慢速度，可

以改善此情形。

4. 避免飲用酒精性飲料，因為酒精會干擾藥物作用，增強降壓效果或造成暈眩。
5. 如果出現睏倦或暈眩的情形，請避免開車、操作機械或從事具有危險性的工作。
6. 非經醫師指示，請勿擅自停藥或增減藥物劑量。
7. 服藥期間若有服用鋰鹽、利尿劑、疼痛或關節炎藥物、鉀補充劑、低鈉鹽者，須先告知醫生。



參考文獻：廠商仿單

制定：104/10/01

修訂：113/03/29