

HMG-CoA 還原酶抑制劑

Statin 類藥物

降血脂藥物



高雄醫學大學附設中和紀念醫院

藥學部

★ 醫師為什麼會開此藥：

降低血中膽固醇和三酸甘油脂，有助於預防心臟疾病、心絞痛（胸痛）、中風和心臟病發作。

★ 該如何使用這個藥？

請遵照醫師指示服藥；請勿自行停藥，或自行增加或減少劑量。

★ 如果忘記使用怎麼辦？

當您想起時盡快補服一個劑量，若想起的時間已接近下次服藥時間，則不補服並繼續按照原時間服用下一次劑量即可，千萬不要服用雙倍劑量。

★ 使用藥物後可能會出現的副作用：

1. 頭痛、腸胃不適、腹痛、腹瀉、便秘、腸胃脹氣，若症狀持續請回診告訴醫師。
2. 異常疲倦或虛弱、肌肉痠痛或無力請立即與醫師或藥師聯絡。

★ 懷孕或哺乳時該怎麼辦？

孕婦、授乳婦女禁用此藥。若您計畫懷孕或已懷孕，請告知您的醫師或藥師。

★ 該如何儲存這個藥品？

請連同藥袋置於室溫之陰涼乾燥處，避免陽光直

曬，並避免孩童誤拿。

★ 藥師叮嚀：

1. 若您有肝臟疾病，請告知您的醫師或藥師，並定期檢查肝功能。
2. 若您有服用以下藥品，請告知您的醫師或藥師：其它的降血脂藥物（如 bezafibrate、fenofibrate、gemfibrozil），菸鹼酸，免疫抑制劑(cyclosporine)，毛地黃 (digoxin)，抗生素（如 erythromycin），抗黴菌藥(如 itraconazole)，抗凝血劑（如 warfarin）等。
3. 不要與葡萄柚或柚子併服，因可能會抑制本藥的代謝而增加血液中藥品的濃度，可能會增加藥物副作用發生的機率。
4. 不要與紅麴膠囊併用，因為紅麴內含有藥物類似成分，可能會增加藥物副作用。
5. 避免飲酒或減少酒精性飲料攝取，因酒精性飲料會增加肝臟疾病的發生機會。



參考文獻：廠商仿單

制定：104/10/01
修訂：113/03/29