HMG-CoA 還原酶抑制劑 Statin 類藥物 降血脂藥物



高雄醫學大學附設中和紀念醫院 藥學部

◎ 醫師為什麼會開此藥:

降低血中膽固醇和三酸甘油脂,有助於預防心臟疾病、心絞痛(胸痛)、中風和心臟病發作。

◎ 該如何使用這個藥 ?

請遵照醫師指示服藥;請勿自行停藥,或自行增加或減少劑量。

☑ 如果忘記使用怎麼辦?

當您想起時盡快補服一個劑量,若想起的時間已 接近下次服藥時間,則不補服並繼續按照原時間 服用下一次劑量即可,千萬不要服用雙倍劑量。

◎ 使用藥物後可能會出現的副作用:

- 頭痛、腸胃不適、腹痛、腹瀉、便秘、腸胃脹氣, 若症狀持續請回診告訴醫師。
- 異常疲倦或虚弱、肌肉痠痛或無力請立即與醫師或藥師聯絡。

◎ 懷孕或哺乳時該怎麼辦 ?

孕婦、授乳婦女禁用此藥。若您計畫懷孕或已懷 孕,請告知您的醫師或藥師。

◎ 該如何儲存這個藥品?

請連同藥袋置於室溫之陰涼乾燥處,避免陽光直

曬,並避免孩童誤拿。

◎ 藥師叮嚀:

- 1. 若您有肝臟疾病,請告知您的醫師或藥師,並<u>定期</u> 檢查肝功能。
- 2. 若您有服用以下藥品,請告知您的醫師或藥師:其它的降血脂藥物(如 bezafibrate、fenofibrate、gemfibrozil),菸鹼酸,免疫抑制劑(cyclosporine),毛地黃(digoxin),抗生素(如 erythromycin),抗黴菌藥(如 itraconazole),抗凝血劑(如 warfarin)等。
- 3. <u>不要與葡萄柚或柚子併服</u>,因可能會抑制本藥的代 謝而增加血液中藥品的濃度,可能會增加藥物副作 用發生的機率。
- 4. <u>不要與紅麴膠囊併用</u>,因為紅麴內含有藥物類似成分,可能會增加藥物副作用。
- 5. 避免飲酒或減少酒精性飲料攝取,因酒精性飲料會增加肝臟疾病的發生機會。



參考文獻: 廠商仿單

制定:104/10/01 修訂:114/03/31