硫醯基尿素類 口服降血糖藥物 (Sulfonylureas)



高雄醫學大學附設中和紀念醫院 藥學部

◎ 醫師為什麼會開此藥:

治療第二型糖尿病,透過增加體內胰島素的分泌, 達到降血糖的效果。

☑ 用法用量:

請遵照醫師指示服用,每次最好在相同的時間服 用,不可隨便停藥亦不可自行更改劑量。

◎ 服藥注意事項:

- 1. 飲食及運動應規律,定量且定時。延遲飲食或過度運動會引起低血糖。
- 2. 服藥期間,應告知醫師所有服用之藥物。
- 3. 如懷孕或授乳應告知醫師,孕婦之糖尿病應以胰島素 控制。
- 4. 應告知醫師腎、肝、心臟、甲狀腺、嚴重感染及內分 泌等疾病。
- 5. 飲酒要適量。因飲酒可能引起低血糖,或可能引起胃 痛、噁心、嘔吐、頭痛、冒汗等反應,故應避免。
- 6. 確實遵照醫囑檢驗血糖,以便醫師評估療效,調整劑 量。

- 7. 如有高血糖症狀,例如:極度口渴、多尿、皮膚乾燥、 視力模糊、噁心及嘔吐等症狀,應告知醫師,以調整 劑量或飲食。
- 8. 如有任何手術、牙科處置及急診處理時,應告知醫師 服用此類藥物。
- 外出時應隨身攜帶方糖、糖果、餅乾等,發生低血 糖時可隨時服用。

○ 忘記服藥怎麼辦?

發現忘記服藥時請儘快補服,若發現的時間已接近下次服藥時間就不補服。千萬不可服用雙倍的劑量,忘記服藥的時間可以記錄下來,待下次門診時再與醫師討論。

◎ 懷孕或哺乳時該怎麼辦:

可能懷孕或哺乳的婦女,請告知您的醫師或藥師。

症狀	如何處理
皮膚發疹、搔癢;皮膚、	請立即就醫
眼睛變黃,尿液變深;喉	
嚨痛、持續發燒等	
低血糖:飢餓、頭暈、心	立即補充下列任一項食
跳加速、臉色蒼白、冒冷	物:果汁或糖水、糖果或
汗、說話困難、全身無力	方糖、糖包、葡萄糖片。
等	如未見改善,應立即送醫
嚴重低血糖發生痙攣、昏	不可進食,並立即送急診
迷時	· 進 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
眩暈、胃腸不適、噁心、	如症狀持續,於就診時應
嘔吐、體重增加 🦠	告知醫師

○ 該如何儲存這個藥品?

請連同藥袋置於室溫之陰涼乾燥處,避免陽光直曬,並避免孩童誤拿。

參考文獻: 廠商仿單

制定:104/10/01 修訂:114/03/31