

硫醯基尿素類  
口服降血糖藥物  
(Sulfonylureas)



高雄醫學大學附設中和紀念醫院

藥學部

## ★ 醫師為什麼會開此藥：

治療第二型糖尿病，透過增加體內胰島素的分泌，達到降血糖的效果。

## ★ 用法用量：

請遵照醫師指示服用，每次最好在相同的時間服用，不可隨便停藥亦不可自行更改劑量。

## ★ 服藥注意事項：

1. 飲食及運動應規律，定量且定時。延遲飲食或過度運動會引起低血糖。
2. 服藥期間，應告知醫師所有服用之藥物。
3. 如懷孕或授乳應告知醫師，孕婦之糖尿病應以胰島素控制。
4. 應告知醫師腎、肝、心臟、甲狀腺、嚴重感染及內分泌等疾病。
5. 飲酒要適量。因飲酒可能引起低血糖，或可能引起胃痛、噁心、嘔吐、頭痛、冒汗等反應，故應避免。
6. 確實遵照醫囑檢驗血糖，以便醫師評估療效，調整劑量。

7. 如有高血糖症狀，例如：極度口渴、多尿、皮膚乾燥、視力模糊、噁心及嘔吐等症狀，應告知醫師，以調整劑量或飲食。
8. 如有任何手術、牙科處置及急診處理時，應告知醫師服用此類藥物。
10. 外出時應隨身攜帶方糖、糖果、餅乾等，發生低血糖時可隨時服用。

### ★ 忘記服藥怎麼辦？

發現忘記服藥時請儘快補服，若發現的時間已接近下次服藥時間就不補服。千萬不可服用雙倍的劑量，忘記服藥的時間可以記錄下來，待下次門診時再與醫師討論。

### ★ 懷孕或哺乳時該怎麼辦：

可能懷孕或哺乳的婦女，請告知您的醫師或藥師。

❁ 此類藥物可能引起的副作用有哪些？  
如果發生了該怎麼辦？

症狀	如何處理
皮膚發疹、搔癢；皮膚、眼睛變黃，尿液變深；喉嚨痛、持續發燒等	請立即就醫
低血糖：飢餓、頭暈、心跳加速、臉色蒼白、冒冷汗、說話困難、全身無力等	立即補充下列任一項食物：果汁或糖水、糖果或方糖、糖包、葡萄糖片。 如未見改善，應立即送醫
嚴重低血糖發生痙攣、昏迷時	不可進食，並立即送急診
眩暈、胃腸不適、噁心、嘔吐、體重增加	如症狀持續，於就診時應告知醫師

❁ 該如何儲存這個藥品？

請連同藥袋置於室溫之陰涼乾燥處，避免陽光直曬，並避免孩童誤拿。

參考文獻：廠商仿單

制定：104/10/01

修訂：113/03/29