

吸必擴都保定量粉狀吸入劑 Symbicort® Turbuhaler® (Budesonide/Formoterol 160/4.5 ug/dose)



衛教單內容



操作影片



高雄醫學大學附設中和紀念醫院

藥學部

★ 醫師為什麼會開此藥：

治療氣喘及慢性阻塞性肺病之病患。

★ 此藥品該如何使用：


依照醫師指示頻次使用。

1. **轉**：轉開瓶蓋，將紅色轉鈕轉到最大程度，再往回轉，聽到喀一聲，表示已上藥。



2. **吐**：緩緩吐氣，但請勿朝著吸嘴吐氣。

3. **吸**：接著將嘴巴含住吸嘴，用力深吸氣，接著憋氣約 5~10 秒，之後再緩緩吐氣即可。若需要第二次劑量，請問



隔 30 秒。

4. **漱**：每次使用完吸入劑，記得要漱口，把頭後仰深漱到喉嚨，並將漱口水吐掉，重覆 3 次以上。

★ 使用此藥品該注意什麼：

- ✓ 對藥物會過敏者，須事先告知醫師或藥師。
- ✓ 可定期每週一次用乾布擦拭吸嘴外側，不要用水或其他液體清潔吸嘴。
- ✓ 如果不小心多轉了一次吸入劑，仍然只會吸入一次劑量，但劑量指標會隨之減少。
- ✓ 當搖晃吸入劑有聽到沙沙聲，不是藥物所產生的，而是乾燥劑的聲音。

★ 服藥後可能會出現的副作用：

聲音嘶啞、發音困難、喉嚨刺激、頭痛、口腔及喉嚨的念珠菌感染、心悸。

★ 懷孕或哺乳時該怎麼辦：

如果您準備懷孕或已懷孕，應告知並與您的醫師討論。計劃授乳的婦女，請於開始用藥前告知您的醫

師或藥師。

★ 忘了用藥怎麼辦：

當您想起時盡快補用一個劑量，若想起的時間已接近下次用藥時間，則不補用並繼續按照原時間使用下一次劑量即可，千萬不要使用雙倍劑量。

★ 藥品該如何存放：

請放置在室溫的陰涼乾燥處，不建議放在過熱或陽光可照射到的地方。

★ 何時該更換藥品：

1. 當指標背景呈紅色時，表示所剩餘 10 個劑量。
2. 當劑量窗口中間出現 0 時，表示藥物已經用完。

參考文獻：廠商仿單