

克流感 Tamiflu®
(Osetamivir
75 mg/膠囊)



高雄醫學大學附設中和紀念醫院
藥學部

★ 醫師為什麼會開此藥：

流行性感冒及其他相關症狀。

★ 此藥品該如何使用：

依照醫師指示服藥，一般用法一天兩次，服用5天，

以開水吞服。請勿自行停藥，或自行增減劑量。

★ 使用此藥品該注意什麼：

- ✓ 對藥物會過敏者，須事先告知醫師或藥師。
- ✓ 不可將您服用的藥品給您的家人或朋友服用。
- ✓ 即使症狀改善了，仍需服用完所有劑量，才能完全控制體內病毒。

★ 服藥後可能會出現的副作用：

若以下症狀發生嚴重的情形或是無法消除時，請立

即回診：腸胃道不適、腹瀉、過敏、失眠、眩暈、

認知或行為改變等。

★ 忘了用藥怎麼辦：

當您想起時盡快補服一個劑量，若想起的時間已接近下次服藥時間，則不補服並繼續按照原時間服用下一次劑量即可，千萬不要服用雙倍劑量。

★ 懷孕或哺乳時該怎麼辦：

懷孕或哺乳婦女，請告知您的醫師。

★ 藥品該如何存放：

- ✓ 儲存於室溫乾燥處，避免陽光直射。
- ✓ 不要放在浴室、廚房或潮濕的地方，因為熱及水氣會使藥物變質。
- ✓ 不要存放過期或是很久不再使用的藥品，過期藥品就應丟棄。
- ✓ 為避免誤食，請將藥品放置在小孩不易拿取之處。



參考文獻：廠商仿單

制定：104/10/01

修訂：113/03/29