非炎栓劑 Voren Supp.
(Diclofenac 12.5mg)

高雄醫學大學附設中和紀念醫院

藥學部

✪ 醫師為什麼會開此藥：

治療解熱、鎮痛、消炎及其他相關症狀。

✪ 此藥品該如何使用：

1. 使用前先用肥皂將雙手洗乾淨。
2. 將栓劑的外包裝褪去，若栓劑太軟，可置於冷水或冰箱中使其變硬。
3. 用溫水將栓劑潤濕一下或潤濕肛門周圍，以利於使用。
4. 患者側躺，將靠下方的腿伸直，而上方的腿朝腹部彎曲，將上臀抬高露出肛門。
5. 用手指把栓劑尖端部分插入肛門括約肌超過約一個指節深的位置。
6. 用手把臀部向內加壓幾秒，維持平躺約 15 分鐘以避免栓劑被排出。

7. 把使用過的用品丟棄，並用肥皂洗淨雙手。

✪ 使用此藥品該注意什麼：

✓ 對藥物會過敏者，須事先告知醫師或藥師。

✓ 肝、腎功能異常，及氣喘病患，使用前需事先告知醫師或藥師。

✓ 藥品不使用時(未使用前)應維持藥廠原包裝，勿自行拆裝，避免變質失效。

✪ 用藥後可能會出現的副作用：

可能有頭痛、暈眩、嗜睡、食慾不振、噁心、嘔吐、胃痛及下痢等不適症狀。

✪ 懷孕或哺乳時該怎麼辦：

✓ 如果您準備懷孕或已懷孕，應告知並與您的醫師討論(孕期最後三個月時禁止使用)。

✓ 計劃授乳的婦女，請於開始用藥前告知您的醫師或

藥師。

✪ 貼心小叮嚀：

✓ 使用前後請將雙手洗乾淨，避免感染。

✓ 請放置在室溫的陰涼乾燥處，若栓劑變軟，可置放於冷水或冰箱中，待變硬後再使用；並避免孩童誤拿。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院
KAOHSIUNG MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL
1957

參考文獻：廠商仿單

制定：104/10/01
修訂：114/03/31