

菌巴達懸液用粉
Azithrom® susp.
(Azithromycin
40 mg/mL, 15 mL/Bot)



高雄醫學大學附設中和紀念醫院
藥學部

★ 醫師為什麼會開此藥：

感染及其他相關症狀。

★ 此藥品該如何使用：

✓ 配製方式：

1. 將藥粉搖散。

2. 以內附針狀量筒取 9 mL 冷開水加入瓶內，搖晃均勻，配製成 15 mL 懸浮液。

✓ 每次服用前請先搖晃均勻。

✓ 請遵照醫師指示於正確時間服藥，不可隨便停藥
或更改劑量。

★ 使用此藥品該注意什麼：

✓ 對藥物會過敏者，須事先告知醫師或藥師。

✓ 不要將您服用的藥品給您的家人或朋友服用。

★ 服藥後可能會出現的副作用：

噁心嘔吐、腹痛腹瀉、過敏等。

★ 忘了用藥怎麼辦：

當您想起時盡快補服一個劑量，若想起的時間已接近下次服藥時間，則不補服並繼續按照原時間服用下一次劑量即可，千萬不要服用雙倍劑量。

★ 藥品該如何存放：

1. 尚未泡製的藥品：請放置於陰涼乾燥處（ $<30^{\circ}\text{C}$ ）。
2. 已經泡製好的藥品：請蓋好瓶蓋，儲存於室溫，可保存 10 天。



參考文獻：廠商仿單

制定：104/10/01

修訂：113/03/29