

外用耳滴劑的使用方法

Mycomb otic drop 5mL/Bot
美康耳用滴劑



Ofloxin Otic 3mg/mL, 5mL/Bot
耳普欣點耳液



高雄醫學大學附設中和紀念醫院

藥學部

使用方式：

1. 用肥皂及清水將雙手洗淨，外耳擦拭乾淨。
2. 耳滴劑若是放在冷藏，建議可以在使用前將藥品握在手心數分鐘，使耳滴劑和體溫相近，避免暈眩。
3. 若耳滴劑為混濁的懸浮液，使用前先充分振搖約十秒鐘。
4. 以側躺或傾斜之姿勢，使將給藥的耳朵朝上，為使耳滴劑流入耳內，成人要將耳朵往後上方拉，兒童（3歲以下）則要將耳朵往後下方拉。
5. 依指示將所需耳滴數滴進耳朵內，然後輕拉耳朵使藥液流入或輕壓耳珠數下。
6. 保持頭部傾側約十分鐘，再側頭讓用藥耳朵朝下，使藥物自然流出，擦掉流出耳道外的藥物即可，不要擦掉耳道內藥物。

7. 使用完畢後將蓋子旋緊。



8. 將雙手洗淨。

注意事項：

1. 切勿使用已變色、變質或過期的耳滴劑。

2. 點藥水時，請勿讓藥瓶瓶口接觸耳朵，以防藥水遭

受細菌污染。





參考文獻：廠商仿單

制定：104/10/01

修訂：113/03/29