

諾快寧口服懸液用粉劑

**Curam Powder  
for Oral Suspension  
60mL/Bot**



高雄醫學大學附設中和紀念醫院

藥學部

## ★ 醫師為什麼會開此藥：

感染及其他相關症狀。

## ★ 此藥品該如何使用：

✓ **配製方式**：慢慢加入冷開水將藥粉溶解搖勻，最終加水至瓶身凹槽處。

✓ 每次使用前請先搖晃均勻再使用。

✓ 請遵照醫師指示，於正確時間服藥，不可隨便停藥或更改劑量。

## ★ 使用此藥品該注意什麼：

✓ 對藥物會過敏者，須事先告知醫師或藥師。

✓ 不要將你服用的藥品給你的家人或朋友服用。

## ★ 服藥後可能會出現的副作用：

腸胃道不適(可與食物一起服用來緩解症狀)、腹瀉、過敏等。

## ★ 忘了用藥怎麼辦：

當您想起時盡快補服一個劑量，若想起的時間已接近下次服藥時間，則不補服並繼續按照原時間服用下一次劑量即可，千萬不要服用雙倍劑量。

## ★ 藥品該如何存放：

1. 尚未泡製的藥品 請放置於陰涼乾燥處（ $<30^{\circ}\text{C}$ ）。
2. 已經泡製好的藥品 請蓋緊瓶蓋，儲存於冰箱冷藏，可保存7天。





參考文獻：廠商仿單

制定：104/10/01

修訂：113/03/29