

樂得美乳膏

Aldara cream ®

Imiquimod cream 5% 250 mg/Pack



高雄醫學大學附設中和紀念醫院

藥學部

★ 醫師為什麼會開此藥：

治療成人生殖器外部疣、肛門周圍疣和濕性尖疣。

★ 此藥品該如何使用：

- ✓ 通常為每週使用三次，最多使用 16 週，但以醫師指示使用為主，不可隨便停藥或更改劑量。
- ✓ 建議睡前洗淨雙手後，以手指將乳膏薄薄一層塗於患部，按摩至乳膏完全滲透，看不見乳膏為止。
- ✓ 塗藥完成後，請用中性肥皂和清水清洗雙手。
- ✓ 使用 6-10 小時後(第二天早晨)，用中性肥皂和清水將患部洗淨。



★ 使用此藥品該注意甚麼：

- ✓ 治療的患部不能使用繃帶包紮或覆蓋紗布。
- ✓ 塗上藥品後，要避免性接觸，即使戴保險套和陰道隔膜亦不建議性接觸，因為會使保險套和陰道隔膜功能失效。
- ✓ 患部有皮膚炎或未癒合傷口，不推薦使用本藥。
- ✓ 治療包皮下疣時，應每日掀起包皮做清潔。

★ 藥品使用後可能出現的副作用：

- ✓ 塗藥區域或其周圍可能會出現輕、中度的皮膚反應：如灼熱或癢感、刺痛、皮膚退色。若患部反應嚴重可停用幾天，待皮膚反應消退後再度使用。
- ✓ 若出現嚴重皮膚反應：紅斑、糜爛、剝皮及浮腫，立即使用中性肥皂和清水洗淨，並儘速告知醫師。

★ 忘了用藥怎麼辦：

- ✓ 想起時盡快於當日睡前補用一次，若想起的時間已接近下次擦藥時間，則不補用並繼續按照原時間使用下一次劑量，不要使用雙倍劑量。



★ 藥品該如何存放：

- ✓ 請將藥品放置在小孩不易拿取之處。
- ✓ 應存放在陰涼乾燥處，不可冷藏。



參考文獻：廠商仿單

制定：104/10/01
修訂：114/03/31