

麻藥貼片

Opiodur patch

Fentanyl patch



衛教單內容



操作影片



高雄醫學大學附設中和紀念醫院

藥學部

★ 醫師為什麼會開此藥：

1. 經醫師評估需長期使用嗎啡類止痛劑，來緩和長期慢性疼痛。
2. 不適合口服嗎啡類藥物者或效果不佳者

★ 此藥品該如何使用：

- 1、使用貼片前需用清水清潔或擦拭皮膚（勿用肥皂），清潔後使皮膚完全乾燥，若有毛髮需剪掉（勿用刮的以免有傷口）。貼片應貼於前胸、後背或上臂皮膚平坦部位，避開傷口及放射治療的部位。
- 2、打開包裝取出貼片，移除硬護膜（勿觸摸軟膠膜的黏著面），貼上皮膚並壓緊 30 秒，確保貼片和皮膚緊密接觸，用清水洗手（勿用肥皂）。
- 3、每一貼片通常可持續 72 小時，三天才換貼一次。
- 4、三天後將貼片撕下，用過的貼片黏著面對折黏合，放入回收袋中繳回醫院銷毀，貼一塊新的貼片於不同部位（同一部位皮膚須相隔數日，才可重複用藥）。

★ 使用此藥品該注意什麼：

- ✓ 對藥物會過敏者，須事先告知醫師或藥師。
- ✓ 請保持貼片完整，不得以任何方法切割或破壞貼片，因會讓藥物的釋出不穩定。
- ✓ 貼片可防水，可以正常洗澡、沐浴或游泳。
- ✓ 貼片要是脫落，不要再貼回去，要換新的一片。
- ✓ 高熱環境會造成貼片藥物釋放量突然增高，產生過量的危險。例如：泡熱水澡、熱敷、電毯、發燒、大量喝酒。
- ✓ 本品為成癮性麻醉藥品，供醫師處方給患者做為疾病治療，請不要將您使用的藥品給家人或朋友使用。
- ✓ 本藥不能做為急性疼痛處理，請用其他止痛藥物。

★ 用藥後可能會出現的副作用：

1. 局部的皮膚反應如：皮疹、紅斑，通常於貼片撕掉24小時後就會自然消失。
2. 噁心、嘔吐、便秘、低血壓、嗜睡、欣快感、呼吸困難。如果症狀惡化則應就醫。

★ 忘了用藥怎麼辦：

想起來的時候，儘快補貼，72 小時(3 天)後再更換，除非醫師指示同時使用二片貼片，否則不可一次同時貼二片之貼片。

★ 懷孕或哺乳時該怎麼辦：

懷孕或哺乳婦女，請告知您的醫師。

★ 藥品該如何存放：

- ✓ 儲存於室溫乾燥處，避免陽光直射。
- ✓ 不要放在浴室、廚房或潮濕的地方，因為熱及水氣會使藥物變質。
- ✓ 請將藥品放置在小孩不易拿取之處。

參考文獻：廠商仿單

制定：104/10/01

修訂：113/03/29