

麻藥貼片

Durogesic patch

Fentanyl patch



高雄醫學大學附設中和紀念醫院
藥學部

止痛貼片須知

麻醉性止痛貼片 使用須知

什麼是麻醉性止痛貼片？

麻醉性止痛貼片是一種**外用**的強效麻醉止痛藥，用來治療慢性疼痛或頑固性疼痛，例如癌症疼痛。

止痛貼片可以用多久？

貼片可提供72小時止痛藥效，一般使用**3天**。首次使用需**12小時**後才會發揮藥效，請勿停用口服止痛藥。



注意事項

1. 請保持貼片的完整性，**不要裁剪貼片**。
2. 黏貼處請**避開傷口、發紅、放射部位或人工血管**。
3. 新的貼片應更換黏貼部位或**間隔原部位兩指寬**。
4. 黏貼部位**勿接觸熱源**如：泡澡、電熱毯等。
5. 貼片有**防水**，游泳或洗澡時不用撕下。
6. 貼片若不小心脫落，請貼新的貼片。
7. 若發生突發性疼痛，**勿自行增加貼片劑量**。

輕微副作用如：



噁心



便祕



出汗



紅疹

- 若有**嚴重副作用**如嗜睡、呼吸困難等，請移除貼片並送醫。

it safe...

ISSUE DATE

DATE...

Patch

麻醉性止痛貼片的使用方法

How to use

1.

選擇適當部位，建議前胸、後背及上手臂，以清水清潔並擦乾。



2.

若黏貼處有毛髮，建議用剪刀去除，勿用刮刀或蜜蠟。



3.

使用前請填寫紀錄單，並用清水洗手，勿用肥皂。



4.

撕開貼片外包裝，將背膜移除，黏貼在選擇部位，手掌輕壓30秒。



5.

確認貼片是否貼緊，必要時可使用透氣膠帶固定，避免脫落。



6.

黏貼時請勿接觸貼布的黏附層，貼完請用清水洗手。



Keep safe and sound

7.

3天後撕下貼片，將其對折放入廢片回收袋並填寫紀錄單。



8.

下次回診時將廢片回收袋給醫師蓋章，並繳回藥局。



操作影片請掃QR code

高醫藥學部關心您



參考文獻：廠商仿單

制定：111/02/04
修訂：113/03/29