

Ellipta® 易利達吸入劑

Relvar Ellipta

Anoro Ellipta

Trelegy Ellipta



衛教單內容



操作影片



高雄醫學大學附設中和紀念醫院

藥學部

★ 醫師為什麼會開此藥：

治療慢性呼吸道阻塞疾病或氣喘之病患。

★ 此藥品該如何使用：

<p>1. 打開：</p> <p>將蓋子往下推，直到聽見「喀嚓」聲，吸入劑先不要靠近嘴邊，對旁邊先盡量吐氣。</p>	
<p>2. 吸入：</p> <p>雙唇確實含著吸嘴，不要有空隙，手指不要擋住通氣孔。此時請用力緩慢深深吸一口氣，然後閉氣至少 3-4 秒。</p>	
<p>3. 關上：</p> <p>取出吸入劑，慢慢吐氣。將蓋子往上推，確實蓋住吸嘴。</p>	

★ 使用此藥品該注意什麼：

- ✓ 要吸藥時才可以打開蓋子；如果打開蓋子，沒有吸入藥物就關上，會損失一次藥物劑量。
- ✓ 此藥品無明顯氣味，不需要擔心沒有吸入藥物。
- ✓ 每一次使用後，劑量計數器的數字會逐次減少。
- ✓ 每次吸藥後(潤娃或肺樂喜)，請用清水漱口，可以減少口腔或喉嚨疼痛、感染、聲音沙啞的情況。漱口方式：每次使用完，把頭後仰，深漱至喉嚨，並將漱口水吐掉，重複3次。
- ✓ 本藥不能做為急救用途。

★ 服藥後可能會出現的副作用：

聲音嘶啞、喉嚨刺激、頭痛、鼻咽炎、上呼吸道感染、口腔及喉嚨的念珠菌感染、心悸。如上述症狀持續，請回診告知醫師。

★ 懷孕或哺乳時該怎麼辦：

孕婦或哺乳婦應告知並與您的醫師討論。

★ 忘了用藥怎麼辦：

當您想起時盡快補用一個劑量，若已接近下次用藥時間，則不補用並繼續按照原時間使用下一次劑量即可，千萬不要使用雙倍劑量。

★ 藥品該如何存放：

請放置在室溫的陰涼乾燥處，開封後效期 1 個月。

★ 何時該更換藥品：

1. 當吸入劑只剩下小於 10 劑的劑量，計數器的左邊會呈現紅色提醒您需要準備新的吸入劑。
2. 當劑量窗口中間出現 0 時，表示藥物已經用完。

參考文獻：廠商仿單

制定：106/04/17

修訂：113/03/29