

樂癒痔軟膏

High-Xylmol Ointment

15g/Tube



高雄醫學大學附設中和紀念醫院

藥學部

★ 醫師為什麼會開此藥：

治療內外痔、肛門裂傷或搔癢及其他相關症狀。

★ 此藥品該如何使用：

1. 將肛門部位洗淨並擦乾，接著用肥皂將雙手洗乾淨。
2. 患者側躺，將靠下方的腿伸直，而上方的腿朝腹部彎曲，將上臀抬高露出肛門。

外痔或肛門裂傷：請以棉花棒沾取適量藥膏後，直接塗抹於患部。

內痔：

- ✓ 將軟膏蓋子取下後，把輔助管旋緊於軟膏管口處，並將輔助管蓋子取下。
- ✓ 小心地將管口插入直腸內，並擠壓軟膏，這樣藥膏就可以順利塗抹於患部。
- ✓ 使用完後，將輔助器和軟膏分開，軟膏蓋子旋緊，並以肥皂和清水清洗輔助器。

- ✓ 如輔助管插入直腸時感覺不適，可先在輔助管上塗抹凡士林等潤滑劑，降低不適感。

★ 使用此藥品該注意什麼：

- ✓ 對藥物會過敏者，須事先告知醫師或藥師。

★ 用藥後可能會出現的副作用：

可能有肛門刺激感、燒灼感或疼痛等不適症狀。

★ 忘了用藥怎麼辦：

當您想起時盡快補用一個劑量，若想起的時間已接近下次用藥時間，則不補用並繼續按照原時間使用下一次劑量即可，不要使用雙倍劑量。

★ 貼心小叮嚀：

- ✓ 調整生活習慣可預防痔瘡或防止痔瘡的惡化，如規

律的生活作息、適量運動、高纖飲食及每天喝
1500~2000ml 的水。

- ✓ 請放置在室溫的陰涼乾燥處，如發生變質或過期，
請丟棄勿使用。



參考文獻：廠商仿單

制定：106/10/31

修訂：113/03/29