

艾敏釋鼻噴劑
Avamys[®] Nasal Spray
(Fluticasone furoate 27.5
mcg/Dose, 120 Dose/Bot)



衛教單內容



操作影片



高雄醫學大學附設中和紀念醫院

藥學部

★ 醫師為什麼會開此藥：
過敏性鼻炎。

★ 該如何使用：

- ✓ 請遵照醫師指示。
- 通常一天一次，固定時間使用。

★ 結構說明：



★ 第一次使用前準備：

1. 蓋上蓋子，並將鼻噴劑用力搖勻（大約 10 秒）



2. 用拇指與食指輕輕夾著蓋子兩邊，取下蓋子。




3. 垂直拿著鼻噴劑，並將噴嘴向外。按壓釋放鈕按到底，並重覆直到空中出現均勻噴霧。



★ 每日操作步驟：

1. 先擤清鼻孔，將鼻噴劑用力搖勻（大約 10 秒）並取下蓋子。




2. 頭稍微向前傾。
3. 將噴嘴放進鼻腔，朝外側噴（遠離鼻中膈）。



4. 用鼻子吸氣時，將釋放鈕按到底。

5. 移除噴嘴並用口呼氣。
6. 使用完畢，以乾紙巾擦拭噴嘴並蓋回蓋子。



✓ 若兩側鼻孔都要噴，請移至另一邊鼻孔，重複步驟 3、4、5。

✪ 使用此藥品該注意什麼：

- ✓ 請勿往鼻中膈方向噴。
- ✓ 請勿使用任何針或利器戳噴嘴。
- ✓ 噴藥的時候頭前傾，保持藥瓶直立。
- ✓ 對藥物過敏者，須事先告知醫師或藥師。
- ✓ 不可將您使用的藥品給您的家人或朋友使用。
- ✓ 有白內障或青光眼的病人請先與醫師討論。
- ✓ 不確定還有沒有藥物時，可由劑量窗格看到剩餘藥量。
- ✓ 若超過 30 天未使用或是 5 天以上未加蓋，則需測試按壓數下直到均勻氣霧噴出。

✪ 用藥後可能會出現的副作用：

- ✓ 可能的副作用有頭痛、流鼻水、喉嚨痛、發燒、咳嗽。
- ✓ 若以下症狀發生嚴重的情形或是無法消除時，請立即通知您的醫師：鼻出血、鼻潰瘍、傷口癒合不全。

✪ 忘了用藥怎麼辦：

當您想起時盡快使用一個劑量，若想起時已接近下次用藥時間，則不使用並繼續按照原時間使用下一次劑量即可，千萬不要使用雙倍劑量。

✪ 藥品該如何存放：

- ✓ 存放於室溫、避免陽光直接照射。
- ✓ 藥品開封後可用至保存期限，超過保存期限請勿再使用。





參考文獻：廠商仿單

制定：104/10/01
修訂：113/03/29