

普力馬林陰道乳膏

Premarin vaginal cream (0.625mg/g , 14g/Tube)



高雄醫學大學附設中和紀念醫院

藥學部

★ 醫師為什麼會開此藥：

治療萎縮性陰道炎及其他相關症狀。

★ 此藥品該如何使用：

<p>1. 使用前先將雙手洗乾淨。</p> 	<p>2. 打開軟膏管蓋子</p> 
<p>3. 將塗藥器拴緊在軟膏管嘴上</p> 	<p>4. 壓擠軟膏管使軟膏依所需劑量擠入塗藥器內</p> 
<p>5. 將塗藥器從軟膏管上取下</p> 	<p>6. 採仰躺姿勢，膝蓋彎曲，將含有藥膏的塗藥器輕輕插入陰道深部，推動推管將藥膏完全推入陰道中。</p> 
<p>7. 使用後的塗藥器可將推管及容器管分開，用少許肥皂和溫水沖洗。</p>	

★ 使用此藥品該注意什麼：

- ✓ 用法用量請依照醫師指示用藥
- ✓ 曾對 Premarin, Estrogen 過敏者，須事先告知醫師或藥師。

★ 用藥後可能會出現的副作用：

陰道塗抹部位不適，包括灼熱、刺激感。

★ 懷孕或哺乳時該怎麼辦：

懷孕或授乳的婦女，應告知並與您的醫師討論。

★ 貼心小叮嚀：

- ✓ 使用前後請將雙手洗乾淨，避免感染。
- ✓ 請放置在室溫的陰涼乾燥處，並避免孩童誤拿。



參考文獻：廠商仿單

制定：106/10/31

修訂：113/03/29