

優力黴素口服懸液用顆粒

Ulexin syrup®

Cephalexin



高雄醫學大學附設中和紀念醫院

藥學部

⊛ 為什麼要服用此藥品：

感染及其他相關症狀。

⊛ 該如何使用此藥品：

- ✓ 配製方式：先加冷開水至瓶身標示 60 mL 處，搖勻後即可使用。
- ✓ 用法用量請遵照醫師指示，於正確時間服藥，不可隨便停藥或更改劑量。
- ✓ 每次使用前請先搖晃均勻再使用。

⊛ 使用藥品後可能會出現的副作用：

1. 腸胃道不適、腹瀉、過敏等。
2. 副作用並非每個人都會發生，請依醫生指示服用藥品。

✪ 忘了服藥怎麼辦：

當您想起時盡快補服一個劑量，若想起的時間已接近下次服藥時間，則不補服並繼續按照原時間服用下一次劑量即可，千萬不要服用雙倍劑量。

✪ 懷孕或哺乳時該怎麼辦：

準備懷孕或哺乳的婦女，請告知您的醫師。

✪ 藥品該如何存放：

1. 尚未泡製的藥品請放置於陰涼乾燥處。
2. 泡製後必須冷藏儲存，並在7天之內使用，使用前請搖勻。
3. 避免放在孩童可以取得的場所。
4. 若藥品超過保存期限請丟棄。



參考文獻：廠商仿單

制定：106/11/30

修訂：113/03/29